


НАЦИОНАЛЬНАЯ
АКАДЕМИЯ НАУК УКРАИНЫ

КАРАДАГСКИЙ
ПРИРОДНЫЙ ЗАПОВЕДНИК



ЛЕТОПИСЬ ПРИРОДЫ,
1997

Карадаг

1998

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК УЗБЕКИСТАНА

ДРОВ 2020

ДРОВ 98

ДРОВ 2010

КАРАДАГСКИЙ ПРИРОДНЫЙ ЗАПОВЕДНИК

Летопись природы, 1997

Институт биологии
южных морей ДН УССР

БИБЛИОТЕКА

№ 1

Карадаг. 1998

1. Наблюдения на Карадагском ландшафтно-экологическом стационаре

Проводился ежемесячный контроль за состоянием полевой влажности почвы, метеорологическими параметрами, грунтовыми водами и поверхностным стоком.

1.1. Полевая влажность почв

Пробы отбирались на глубине 5-10 см на 30 точках. Для нахождения процентной влажности использовался метод прямых весовых измерений. Данные приводятся в таблице 1.1.

Таблица 1.1. Полевая влажность почв, %

N	Янв.	Фев.	Март	Апр.	Май	Июнь	Июль	Авг.	Сент	Окт.	Нояб	Дек.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	23,7	27,7	-	24,3	16,3	13,0	8,0	18,7	19,4	20,7	21,0	27,7
2	22,4	22,8	-	23,9	19,5	13,7	10,0	20,6	20,1	20,1	24,4	29,7
3	24,5	23,0	-	18,8	18,1	13,5	11,0	18,3	16,3	21,7	22,6	24,8
4	15,8	19,7	-	19,1	10,8	10,5	7,5	12,6	14,5	17,2	19,4	20,8
5	24,5	25,7	-	23,7	20,5	15,1	12,8	23,8	18,8	24,2	22,7	21,1
6	20,7	19,4	-	17,7	13,0	11,8	9,5	20,9	16,0	20,1	15,3	23,3
7	34,0	35,2	-	33,2	31,0	20,8	19,8	23,8	22,0	26,3	27,3	36,4
8	36,1	28,8	-	24,1	19,1	14,7	13,2	18,7	16,4	25,2	21,8	32,2
9	27,8	31,9	-	26,7	18,0	12,4	13,6	24,1	21,1	24,1	24,0	26,7
10	26,8	23,5	-	26,2	18,7	13,5	10,0	27,0	18,8	24,5	24,0	27,6
11	27,0	28,3	-	26,1	31,3	17,0	13,9	19,1	19,5	20,5	19,4	27,4
12	27,8	28,4	-	29,9	22,5	16,7	11,6	13,5	16,8	17,4	23,4	30,5
13	29,5	31,2	-	32,1	19,7	19,0	12,0	23,4	20,2	23,1	25,1	29,4
14	27,9	18,9	-	24,2	21,8	14,5	15,4	22,0	11,7	15,7	21,3	24,8
15	29,1	24,9	-	19,5	14,5	11,9	9,4	17,3	15,9	19,0	17,8	20,7
16	29,8	26,1	-	32,7	37,8	21,0	17,2	22,5	25,5	31,7	31,5	25,2
17	31,2	31,1	-	41,1	30,2	20,8	15,7	27,5	21,7	25,2	26,9	34,9
18	26,2	25,1	-	30,1	20,7	19,9	14,1	24,1	16,8	20,3	25,3	22,1
19	31,8	27,7	-	28,8	29,5	19,0	16,7	16,1	19,1	22,8	23,5	24,7
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	15,3	18,4	-	16,6	9,4	7,3	6,6	16,0	10,8	17,8	16,1	18,1
22	15,1	15,3	-	18,1	11,8	10,3	5,6	19,0	10,9	15,0	15,7	19,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	24,5	26,0	-	24,1	22,2	13,5	10,6	21,4	19,7	16,3	24,4	31,8
24	28,8	35,3	-	41,4	31,8	25,4	14,8	21,1	24,0	26,2	27,0	35,5
25	24,9	32,5	-	23,9	19,1	15,6	12,1	17,5	16,9	23,5	22,2	29,3
26	24,8	22,5	-	23,8	15,8	13,8	11,4	18,5	14,0	16,9	23,8	26,5
27	23,0	20,4	-	24,7	15,2	12,4	11,7	19,2	13,5	21,2	22,7	30,1
28	36,2	30,0	-	28,4	27,5	17,2	16,3	23,8	17,6	26,7	22,8	26,7
29	37,8	30,2	-	41,7	24,5	24,3	18,0	28,5	18,1	27,4	25,7	37,8
30	37,2	34,7	-	44,1	33,0	33,7	23,0	26,0	21,2	22,8	27,3	42,8
31	32,3	36,1	-	39,5	30,1	22,1	17,4	31,4	18,2	23,5	24,1	32,1

1.2. Метеорология

Метеорологические наблюдения осуществлялись на КЛЭС по трем параметрам (табл. 1.2):

- 1) температура воздуха на высоте 1,5 м (в психометрической будке);
- 2) температура на поверхности почвы (на оголенном от растений участке);
- 3) температура в подстилке под пологом леса.

Таблица 1.2. Данные измерений температурного режима

Дата	В будке			На поверхности почвы			В подстилке в лесу		
	сроч	мин.	макс.	сроч.	мин.	макс.	сроч.	мин.	макс.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.01.	4.9	-10.0	8.9	5.1	-10.5	10.4	3.2	-0.7	3.9
13.01	-2.5	-7.7	5.5	0.4	-7.0	6.8	0.1	-1.1	3.5
15.01	5.4	-7.0	5.4	6.9	-7.1	11.3	0.1	-1.4	0.5
20.01	6.7	-3.0	8.5	8.8	-4.8	13.3	5.1	0.2	5.4
23.01	3.8	-1.1	7.7	9.1	-2.0	11.1	3.3	2.0	5.7
27.01	-3.8	-7.4	8.4	3.1	-5.7	13.2	-0.3	-0.5	5.5
30.01	-2.9	-8.9	4.7	5.8	-10.4	8.7	-0.7	-2.3	0.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.02.	-6.5	-10.7	4.5	-2.0	-10.5	10.4	-1.5	-2.5	0.4
5.02.	-2.2	-10.1	-1.8	6.9	-12.3	9.4	-0.8	-3.3	-0.5
10.02	7.2	-5.0	9.5	13.5	-7.7	19.3	2.7	-0.8	2.7
24.02	5.2	-9.0	11.5	14.5	-9.7	21.3	1.7	-1.9	7.7
3.03.	8.2	-3.1	8.8	18.8	-5.5	22.2	6.5	1.0	6.8
17.03	3.4	-2.7	10.7	18.4	-5.9	27.3	5.5	1.5	8.5
24.03	0.5	-7.8	7.9	0.3	-8.8	20.9	0.9	-0.4	6.1
31.03	14.5	-4.3	14.9	21.5	-6.5	21.5	10.0	0.5	10.4
2.04.	16.8	5.3	20.2	28.5	1.1	34.1	12.2	5.5	12.8
7.04.	2.4	2.3	19.9	4.7	2.4	34.2	4.4	2.9	13.7
14.04	10.4	-3.7	11.7	14.5	-6.5	23.2	7.4	1.5	8.2
16.04	9.7	4.0	11.5	16.8	2.0	17.8	9.4	5.0	9.4
21.04	7.2	2.3	12.3	13.3	-0.7	29.1	8.1	5.0	11.4
28.04	14.5	4.5	18.7	37.5	-	40.0	15.0	5.5	15.0
5.05.	14.8	5.5	20.2	37.4	-	41.5	14.1	8.2	16.5
6.05.	17.2	7.8	17.2	39.5	-	39.5	14.1	10.5	15.4
12.05	23.4	10.1	25.3	47.1	-	51.4	17.0	11.5	17.8
19.05	21.7	12.0	28.0	52.5	-	54.3	16.5	14.7	18.8
26.05	20.1	10.2	23.7	40.5	-	49.3	16.3	14.0	17.7
2.06.	17.2	5.9	20.0	40.9	-	48.0	14.2	11.0	16.7
5.06.	18.8	8.5	18.7	26.4	-	51.1	14.5	-	15.5
9.06.	24.9	11.1	25.8	45.3	-	53.3	17.8	14.1	18.2
16.06	22.9	14.3	26.9	52.7	-	56.1	18.7	16.4	19.3
23.06	22.8	13.7	25.8	38.8	-	55.1	19.5	14.2	-
30.06	27.9	15.0	29.4	49.4	-	60.8	22.1	14.9	-
7.07.	27.0	18.1	30.8	50.0	-	61.5	20.4	19.5	22.1
14.07	24.3	15.7	29.1	44.8	-	58.0	18.8	18.1	21.7
21.07	25.8	13.8	26.2	48.9	-	51.5	19.4	16.1	20.3
28.07	26.3	13.9	29.5	43.3	-	52.3	20.3	15.2	20.7
4.08.	23.2	15.9	28.2	37.0	-	52.7	19.4	18.4	21.7
11.08	22.1	-	27.2	27.8	-	47.2	20.3	18.2	22.1
18.08	21.7	14.8	27.7	36.7	-	41.7	18.3	17.7	21.5
25.08	24.7	13.0	27.0	37.0	-	43.0	19.8	15.9	21.2
1.09.	17.2	13.5	25.7	24.2	-	46.1	17.8	17.5	-
8.09.	21.4	7.3	21.5	40.5	-	40.5	16.2	11.8	18.5
15.09	23.7	8.8	23.9	43.5	-	43.5	17.2	13.0	18.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.09	16.8	8.5	23.7	36.4	-	42.5	13.5	11.8	17.4
29.09	14.5	3.5	19.4	21.2	-	38.5	12.2	8.7	14.5
6.10.	17.2	3.7	-	21.4	-	28.2	12.7	9.4	14.5
13.10	16.7	4.9	21.4	20.2	4.8	39.5	15.4	12.5	-
20.10	10.5	7.2	20.3	17.8	6.5	28.8	10.0	7.1	-
27.10	2.8	1.2	15.9	5.2	-2.0	25.0	7.1	6.5	-
3.11.	11.5	-1.7	12.7	22.1	-4.4	22.5	8.1	1.5	8.3
10.11	13.7	-2.0	13.9	19.8	-4.7	21.7	9.8	4.5	9.5
17.11	9.4	3.5	14.5	11.7	1.5	22.0	8.4	8.0	10.2
24.11	8.4	4.4	14.1	11.5	3.5	16.7	8.7	7.1	10.7
1.12.	4.3	0.7	9.4	9.3	-0.7	13.3	5.4	5.0	9.1
8.12	0.4	-1.7	13.2	3.0	-2.0	17.0	3.1	3.5	9.8
15.12	2.5	-4.8	11.7	4.8	-6.5	15.0	4.7	1.7	8.8
22.12	7.4	-11.8	8.1	6.7	-8.7	6.7	5.7	-1.5	5.7
29.12	10.7	0.5	12.4	9.4	-2.2	14.7	6.5	3.7	-

1.3. Грунтовые воды

В 1997 г. для изучения грунтовых вод использовались те же станции, что и в предыдущие два года: источник у южной оконечности хр. Сюрю-Кая и колодец в низовье склоновой балки гряды Беш-Таш. Наблюдения и измерения проводились с периодичностью раз в неделю (табл. 1.3).

1.4. Поверхностный сток

Поверхностный сток измерялся на существующих стоковых площадках (СП N1 и N3). Измерения и отбор проб проводились после интенсивных ливней, длительных дождей, во время таяния снега (табл. 1.4). Поверхностный сток наблюдался только после таяния снега. Пробы переданы для дальнейшей обработки в Симферопольский госуниверситет.

Таблица 1.3. Состояние грунтовых вод

Дата 1997	Источник Сюрю-Кая южный					Колодец			
	Время	Темпе	Темпе	Дебит		Время	Темпе	Темпе	Уровень воды (м)
		рату- ра воз- духа	рату- ра воды	источника время измер	л/с		рату- ра воз- духа	рату- ра воды	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.01	13.45	2.1	13.1	1.32	0.75	13.15	1.5	7.5	-4.690
13.01	12.55	-1.3	13.2	1.30	0.77	12.25	-2.1	5.5	-1.465
20.01	13.30	7.1	13.2	2.35	0.43	12.55	5.7	5.9	-1.380
27.01	13.00	-2.0	13.0	3.15	0.32	12.20	-2.7	5.1	-1.375
3.02	11.05	-5.3	12.7	5.53	0.18	10.45	-6.5	3.2	-1.380
10.02	11.30	7.2	12.7	7.15	0.14	11.10	4.7	3.8	-1.395
24.02	12.55	7.0	12.8	4.95	0.20	12.20	5.1	3.9	-1.425
3.03	13.10	9.3	12.9	6.95	0.14	12.40	8.8	5.0	-1.462
17.03	11.40	3.7	12.5	9.12	0.11	11.20	3.9	4.7	-1.501
24.03	11.35	0.9	12.5	5.17	0.19	11.20	0.5	4.3	-1.485
31.03	13.05	17.2	13.4	1.15	0.87	12.25	12.5	5.9	-1.285
7.04	11.05	3.2	13.0	1.00	1.00	10.40	4.2	5.0	-1.115
14.04	11.10	8.9	13.5	1.41	0.71	10.40	7.8	5.9	-1.280
21.04	12.45	8.7	13.2	1.55	0.70	12.15	7.9	6.5	-1.300
5.05	11.00	16.5	13.4	4.50	0.20	10.35	15.5	9.4	-1.304
12.05	11.05	22.3	13.5	6.15	0.16	10.40	21.2	11.5	-1.360
19.05	14.10	22.1	13.7	7.45	0.13	13.15	22.7	12.1	-1.577
26.05	10.00	19.9	13.7	11.05	0.09	9.30	19.5	12.5	-1.710
2.06	12.50	17.5	13.3	13.10	0.08	12.15	15.7	12.1	-1.805
9.06	13.00	26.2	13.9	16.30	0.06	12.15	24.4	12.7	-1.955
16.06	9.50	23.5	13.9	20.50	0.048	9.20	21.5	12.5	-2.095
23.06	9.40	23.0	13.9	26.82	0.037	9.05	-	-	-2.220
30.06	10.40	25.1	14.3	34.35	0.029	9.50	26.3	13.5	-2.295
7.07	9.05	24.5	14.7	38.85	0.025	8.30	23.7	13.5	-2.357
14.07	11.05	23.2	14.5	33.50	0.029	10.35	20.1	13.2	-2.430
21.07	11.00	25.2	14.8	40.20	0.025	10.20	22.8	13.5	-2.475
28.07	13.00	26.7	14.9	37.28	0.027	12.30	26.3	14.7	-2.517
4.08	12.50	23.1	14.0	9.30	0.110	12.20	22.1	14.5	-2.597

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.08 12.40	22.1	14.2	11.70	0.085	12.05	22.8	14.4	-2.535	
18.08 15.00	22.2	13.8	2.70	0.37	14.30	21.7	14.5	-2.495	
25.08 11.05	23.0	13.9	10.00	0.10	10.35	22.9	14.7	-2.533	
1.09 14.20	17.5	14.1	16.50	0.60	14.50	17.3	14.8	-2.570	
8.09 11.10	19.3	14.5	23.50	0.04	10.40	18.5	14.5	-2.595	
15.09 14.35	23.2	14.8	28.15	0.035	13.50	23.4	14.4	-2.640	
22.09 12.40	16.1	14.8	38.70	0.025	12.15	15.9	14.3	-2.740	
29.09 13.00	15.0	14.5	41.30	0.024	12.15	14.1	13.8	-2.885	
6.10 10.50	13.1	13.5	5.90	0.17	10.20	13.0	13.5	-2.895	
13.10 13.50	17.0	13.8	12.25	0.08	13.00	16.7	13.8	-2.900	
20.10 12.50	11.5	13.5	1.10	0.91	12.20	10.1	13.0	-2.890	
27.10 13.00	2.8	13.0	1.50	0.70	12.40	2.8	11.7	-2.855	
3.11 13.10	10.5	13.2	2.85	0.35	12.30	11.1	12.0	-2.850	
10.11 12.50	17.0	13.5	6.03	0.17	12.15	13.1	12.5	-2.850	
17.11 12.40	10.1	13.2	8.55	0.12	12.15	9.5	11.5	-2.840	
24.11 12.50	8.4	13.1	2.00	0.50	12.25	8.8	11.5	-2.795	
1.12 12.40	4.5	13.0	3.20	0.31	12.15	5.0	10.7	-2.795	
8.12 10.35	0.5	12.9	3.30	0.30	10.05	0.8	10.2	-2.795	
15.12 13.00	2.5	12.8	2.35	0.43	12.35	2.8	9.8	-2.800	
22.12 11.25	7.3	12.9	3.25	0.31	11.00	7.0	9.4	-2.795	
29.12 12.45	11.2	13.1	3.00	0.34	12.15	9.1	8.0	-1.455	

Таблица 1.4. Характеристика проб
поверхностного стока

Дата	N СП	Средняя глубина (см)	Величина пробы, л
6.01.97	СП-1	2.0	1
2.04.97	СП-3	1.8	1
2.04.97	СП-1	1.3	1

2. Флора и растительность

2.1. Макрофитобентос

Мониторинговые исследования макрофитобентоса были проведены по гидробиологическому разрезу у ск. Кузмичев камень на глубинах от 0,65 до 20 м по общепринятой методике (Калугина-Гутник, 1969). Было собрано и обработано 24 количественных пробы водорослей.

Донная растительность района Кузмичёва камня отличается экологической нестабильностью так как ещё в ноябре 1992 года пострадала от 9-бального шторма и находится в стадии восстановительной сукцессии. Если учитывать, что заросли цистозир в результате шторма были уничтожены полностью и их восстановление началось лишь в 1994 году, то в 1997 году распространение цистозир достигло уже глубины 10 м. В то же время биомасса водорослей шельфовой зоны значительно отличалась от "эталонного" состояния в 1970 году. На глубине 1 м эти различия незначительны (3204 г/м² в 1970 году и 3846 г/м² в 1997 году); на глубине 3 м биомасса цистозир уменьшилась в 1,7 раза (3649 г/м² в 1970 году и 2152 г/м² в 1997 году), на глубине 5 м - уменьшилась в 3 раза (3132 г/м² в 1970 году и 783 г/м² в 1997 году), а на глубине 10 м - в 10 раз (1594 г/м² в 1970 году и 158 г/м² в 1997 году). Процесс снижения биомассы доминирующих в прибрежной зоне видов водорослей *Cystoseira crinita* и *C. barbata* характерен для всего побережья Чёрного моря и является следствием антропогенного воздействия. Запасы цистозир у берегов Крыма сократились на 40 % (Мильчакова и др., 1997). Количественные данные по 1997 году представлены в таблице 2.1.

В зоне Карадагского заповедника продолжает отмечаться процесс возрастания биомассы цистозир (в %) в структуре сообщества на глубине 1-3 м, где она составляет 98 % и резкого снижения на глубинах 5 м (63,6 %) и 10 м (18,7 %). В цистозирово-филлофоровой ассоциации биомасса *Phyllophora nervosa* на обнаруживает тенденции к заметным изменениям (208 г/м² в 1970 году, 706 г/м² в 1980 году и 395 г/м² в 1997 году).

Среди сопутствующих видов, принимающих участие в восстановительной сукцессии, можно выделить ядро из 3-х видов - это зелёные *Ulva rigida*, *Cladophora albida* и бурые виды *Ectocarpus*. На глубине 1 м из-за доминирования цистозир эти водоросли не встречаются. На глубине 5 м, где влияние цистозир заметно снижено, биомасса этих водорослей в сумме составляет 76 г/м², а на глубине 10 м - 88,2 г/м².

Таблица 2.1. Изменение видового состава и биомассы (г/м²) массовых видов макрофитов в 1997 году у ск. Кузмичёв камень

Вид	Глубины													
	0,5 м		1 м		3 м		5 м		10 м		15 м		20 м	
	г/м²	г/м²	%	г/м²	%	г/м²	%	г/м²	%	г/м²	%	г/м²	%	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Cystoseira (общая)	4342,0	3846,0	98,9	2152,0	98,6	783,0	63,6	158,26	18,7	-		3,32	37,98	
Ulva rigida		3,45	0,1	-	-	15,3	1,2	29,38	3,5	-				
Corallina		8,97	0,2	3,55	0,2	12,5	1,0	14,37	1,7	-				
Polysiphonia subulifera		17,97	0,5	8,4	0,4	65,0	5,3	4,25	0,5	0,5	1,1			
Ceramium		10,62	0,3	-	-	107,0	8,7	26,09	3,1	35,76	76,7			
Ectocarpus				16	0,7	40,5	3,3	47,88	5,7	7,7	16,5	5,06	57,89	
Cladostephus		0,88	0,04	146,7	11,9	142,2	16,8							
Chaetomorpha				0,24	-	0,02	-	0,28	-					
Apoglossum				0,4	-	0,04	-	-	-					
Cladophora				0,37	-	20,2	1,6	10,8	1,3	1,21	2,6	0,36	4,12	
Sphacelaria						25,2	2,0	-	-					
Laurencia						6,98	0,6	12,08	1,4					
Stilophora						6,38	0,5	1,84	0,2					

Продолжение табл. 2.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Punctaria						0,01	-	-	-				
Polysiphonia						1,35	0,1	-	-	0,6	1,3		
elongata													
Pylophora								394,74	46,7	0,7	1,5		
nervosa													
Chondria								1,26	0,1	0,16	0,3		
Bryopsis								1,3	0,2				
Всего:	4342,0	3887,0	100	2181,84	100	230,44	100	844,77	100	46,64	100	8,74	100

причём, максимальные по разрезу биомассы *Ulva* и *Ectocarpus* приходится на глубину 10 м. На глубине 15 м доминируют виды *Sargassum* (76,7 % биомассы сообщества) и *Ectocarpus* (16,5 % биомассы). На глубине 20 м на долю эктокарпуса приходится 58 %.

В процессе восстановительной сукцессии выявлено, что олигосапробные виды *Laurensia* и *Polysiphonia subulifera*, имеют незначительную биомассу. В прежние времена они занимали ведущее место среди сопутствующих видов. Ухудшение экологической обстановки в прибрежной зоне Карадагского заповедника отразилось на изменении структуры донной растительности. Доминирующее положение среди сопутствующих видов стали занимать водоросли, положительно реагирующие на эвтрофирование среды (Костенко, 1990). Процесс восстановительной сукцессии протекает в сложных условиях антропогенного стресса, что в скором времени может привести к деградации донной растительности.

Ареал зелёной олигосапробной водоросли *Codium vermilara* резко уменьшился в акватории Кара-Дага и находится между бухтами Пуццолановая и Пограничная на глубинах 8-12 м (наблюдения водолаза М. Кондрашова). В полисифониево-занардиниевой ассоциации практически не встречается олигосапробная бурая водоросль *Nereia filiformis*. Таким образом, наблюдающиеся изменения донной растительности могут иметь серьёзные последствия для всей прибрежной экосистемы в целом.

Литература

1. Костенко Н.С. Антропогенные изменения донной растительности Карадагского заповедника // Биол. науки. - 1990 - № 9 - С. 101.
2. Мильнакова Н.А., Евстигнева И.К., Рябушко Л.И., Миронова Н.В., Танковская И.Н. Антропогенные изменения донной растительности Чёрного моря // Проблемы ботаники и микологии на пороге третьего тысячелетия: Материалы X з'їзду Українського ботанічного товариства (Полтава, 22-23 травня 1977 р.), Київ-Полтава, 1997. - С. 71.

2.2. Фитопланктон

Наблюдения 1997 года по своему характеру и задачам не отличались от наблюдений предыдущих лет: изучалось сезонное изменение численности, видового состава и размеров клеток диатомового комп-

лекса фитопланктона заповедной акватории и прилегающих к ней. Сбор планктонных проб осуществляли в тех же точках: ск. Кузьмичев Камень, пирс п. Кара-Даг, пирс п-та "Крымское Приморье" и очистные сооружения пансионата - сетью Джели с глубины 6-10 м.

По видовому составу диатомовый комплекс в 1997 году был несколько разнообразнее и включал следующие компоненты:

1. *Cerataulina bergonii* Perag.
2. *Chaetoceros curvisetus* Cl.
3. *Ch. socialis* Laud.
4. *Ch. affinis* Laud.
5. *Ch. affinis* var. *Willei* (Gran.) Hust.
6. *Ch. affinis* Laud. f. *Schuttii* (Cl.) Pr.-Lavr.
7. *Ch. iusignis* Pr.-Lavr.
8. *Ch. teres* Cl.
9. *Ch. similis* Cl.
10. *Ch. similis* Ostf.
11. *Ch. compressus* Laud.
12. *Ch. coronatus* Gran.
13. *Ch. densus* Cl.
14. *Coscinodiscus gigas* Ehr.
15. *C. janischii* A.S.
16. *C. granii* Gough.
17. *Ditylum brightwellii* (West.) Grun.
18. *Rhizosolenia calcar avis* Schultze.
19. *Rh. alata* Brightw.
20. *Rh. fragillissima* Pergon.
21. *Skeletonema costatum* (Grev.) Cl.
22. *Thalassionema nitzschioides* Grun.
23. *Thalassiosira excentrica* (Ehr.) Cl.

Представленный список свидетельствует о том, что род *Chaetoceros* снова достигает наибольшего разнообразия. Род *Rhizosolenia* и семейство *Coscinodiscus* также являются важными компонентами фитопланктона. *Rh. calcar avis* Schultze встречалась круглый год. *Rh. alata* Brightw. - преимущественно весной и осенью. Из семейства косцинодисковые доминировали *C. granii* Gough. и *C. gigas* Ehr. в отдельные месяцы года. *C. janischii* A.S. присутствовал в летних и осенних пробах. Другие систематические группы были представлены единичными видами.

Как и в предыдущие годы (1993-1996) фитопланктон имел сезонные различия. Наибольшим таксономическим разнообразием отличались ран-

не-весенний, осенний сезоны. Летние пробы были нетрадиционно богаты диатомеями. В пределах наблюдаемых точек количество видов варьировало с конца июня и до конца августа в пределах 11-14, исключая очистные сооружения. Пробы в этой точке имели в течение летнего периода 6-7 видов.

Размеры клеток в наблюдаемый год определялись нами только в ранне-весенний период (по техническим причинам). Популяции диатомей различались величинами клеточных панцирей. Наиболее широкой размерной амплитудой характеризовались периоды укрупнения клеток ведущих форм фитопланктона. Популяции включали клетки с размерами (или шириной) панциря в интервалах от 4 до 400 мкм. Так, например, в сентябре основу комплекса составляли *Rh. calcar avis*, *C. janischii*, *C. granii*, *Th. nitzschoides*, *Ch. affinis* Laud. В связи с этим, в популяции были клетки самых разных размеров: 20 мкм, 40 мкм, 150, 300, 280, 30, 50, 18, 22, 14 и т.д. мкм.

Нами были определены сезоны наиболее интенсивного укрупнения клеток, т.е. моменты образования новой вегетативной крупноклеточной генерации. Таковыми (благоприятными) сезонами можно назвать осенний, середину зимы и весенний периоды года. Необходимо заметить, что для каждого сезона была характерна своя картина смены популяций, которая зависела от систематического состава водорослей, скорости деления клеток, длительности их онтогенеза, интенсивности формирования ведущих размерных групп клеток.

На рисунке 1 представлены кривые, отражающие ежемесячные величины численности диатомей в планктоне 1997 года у пирсов п. Кара-Даг и п-та "Крымское Приморье", а также их сезонные отличия от аналогичных показателей вегетации диатомей в планктоне 1996 года. Сравнение показывает, что оптимальными сезонами обоих лет был осенний и ранне-весенний, однако, для 1997 года отмечаются более высокие величины численности диатомей в летние месяцы-вторая половина июня, июль, август. Рисунок также свидетельствует о более интенсивном размножении водорослей в планктоне прибрежного Кара-Дага (относительно остальных точек) в летне-осенний период 1997 года.

На основании данных по численности и видовому составу были выявлены водоросли-доминанты. В таблицах 2.2-2.5 приведены сведения о роли видов-доминантов в создании численности диатомового комплекса в наблюдаемых нами точках в отдельные сезоны года. Как видно из таблиц, количество доминантов изменяется по сезонам и роль каждого доминанта не одинаково значима в отдельные сезоны. Так, например, в январских пробах прибрежного Кара-Дага доля *Sc. costatum*

численность
(тыс. экз./л)





Рис. 1. Сезонные изменения численности диатомей в планктоне у пирса п. Карадаг (А) и у пирса п-та "Крымское Приморье" (Б) в 1996 (1) и 1997 (2) годах

в общей численности диатомового комплекса составила 76.7 %, а в майских пробах снизилась до 18,9 %. В этом месяце *Sc.costatum* уже не являлась абсолютным доминантом, а входила в группу водорослей, составляющих основу численности диатомового сообщества.

В планктоне у пирса п-та "Крымское Приморье" *Sc.costatum* в течение нескольких месяцев-с января по апрель- четко занимала ведущее место в количественном представительстве диатомей (табл.2.3). В майских популяциях явное численное превосходство принадлежало

Таблица 2.2. Численность видов-доминантов в планктоне у пирса п. Карадаг в 1997 году

Месяц	Водоросль-доминант	Численность		
		общая, экз/л	доми- нанта, экз/л	доля доми- нанта (%)
январь	<i>Skeletonema costatum</i> (Grev.) Cl.	157400	120700	76.7
март	<i>Sc.costatum</i>	316400	184000	58,2
	<i>Chaetoceros curvisetus</i> Cl.		93400	23,1
апрель	<i>Sc.costatum</i>	797100	421000	54,1
	<i>Ch.curvisetus</i>		105000	13,1
	<i>Ch.socialis</i>		171900	21,5
май	<i>Rhizosolenia calcar avis</i> Schultze	738500	390000	52,8
	<i>Ch.curvisetus</i>		163100	22,1
	<i>Sc.costatum</i>		140000	18,9
июнь	<i>Ch.curvisetus</i>	1138000	532000	46,7
	<i>Rh.calcar avis</i>		305600	26,0
	<i>Sc.costatum</i>		183500	16,1
июль	<i>Ch.curvisetus</i>	1305000	405400	31,0
	<i>Ch.socialis</i>		187000	14,3
	<i>Rh.calcar avis</i>		156400	12,0
сентябрь	<i>Rh.calcar avis</i>	1350000	410000	30,3
	<i>Coscinodiscus janischii</i>		340000	26,0
	<i>C.granii</i>		270000	20,0
	<i>Thalassionema nitzschioides</i> Grun.		250000	18,5

Таблица 2.3. Варьирование численности водорослей-доминантов в планктоне у пирса п-та "Крымское Приморье" в 1997 году

Месяц	Водоросль-доминант	Численность		
		общая, экз/л	доми- нанта, экз/л	доля доми- нанта (%)
январь	<i>Skeletonema costatum</i> (Grev.) Cl.	141400	90000	63,6
	<i>Thalassionema nitzschioides</i> Grun.		37000	26,2
февраль	<i>Sc. costatum</i> (Grev.) Cl.	421400	291000	69,1
	<i>Th. nitzschioides</i> Grun.		81900	19,4
	<i>Rhizosolenia calcar avis</i> Schultze		40000	9,5
март	<i>Sc. costatum</i> (Grev.) Cl.	328500	230000	70,0
	<i>Chaetoceros curvisetus</i> Cl.		79100	24,1
апрель	<i>Sc. costatum</i> (Grev.) Cl.	737500	468000	63,4
	<i>Ch. curvisetus</i> Cl.		120000	16,3
	<i>Rh. calcar avis</i> Schultze		56000	7,6
май	<i>Rh. calcar avis</i> Schultze	912200	423000	46,4
	<i>Ch. curvisetus</i> Cl.		180000	19,7
	<i>Sc. costatum</i> (Grev.) Cl.		129600	14,2
июнь	<i>Ch. curvisetus</i> Cl.	1117900	548000	49,0
	<i>Rh. calcar avis</i> Schultze		336000	30,1
	<i>Sc. costatum</i> (Grev.) Cl.		195700	17,5
июль	<i>Coscinodiscus janischii</i> A.S.	1054000	269000	25,5
	<i>Rh. calcar avis</i> Schultze		190000	18,0
	<i>Ch. socialis</i> Laud.		157000	14,0
сентябрь	<i>Rh. calcar avis</i> Schultze	1570000	610000	38,9
	<i>C. janischii</i> A.S.		412000	26,2
	<i>Ch. affinis</i> Laud.		340000	21,7
	<i>Th. nitzschioides</i> Grun.		130000	8,9

Rh. calcar avis. В июне в паре с ней доминантом становится *Ch. curvisetus*. В июле количество доминантов увеличивается, к ним можно отнести водоросли *Ch. socialis*, *C. janischii*. В осенних пробах численность клеток *Rh. calcar avis* вновь занимает ведущее место в планктоне. В состав доминантов вошли также водоросли *Th. nitzschioides*, *Ch. affinis* Laud., *C. janischii*. В бухте у ск. Кузьмичев Ка-

БИБЛИОТЕКА

№ 1

мень массовая водоросль *Sc. costatum* доминирует в феврале, марте вместе с водорослями *Ch. curvisetus* и *Th. nitzschoides* (табл. 2.4). В апреле доминантами были *Ch. curvisetus* и *Sc. costatum*. Согласно данным таблицы 2.4, в остальные представленные месяцы состав ведущих водорослей не изменяется, а наблюдается перераспределение их значимости в создании численности диатомового комплекса.

Зимние и ранне-весенние пробы у очистных сооружений пансионата характеризовались явной лидирующей ролью *Sc. costatum*. В апреле и

Таблица 2.4. Численность водорослей-доминантов в планктоне у ск. Кузмицев Камень в отдельные месяцы 1997 года

Месяц	Водоросль-доминант	Численность		
		общая, экз/л	доми- нанта, экз/л	доля доми- нанта (%)
февраль	<i>Skeletonema costatum</i> (Grev.) Cl.	497200	315000	63,4
	<i>Thalassionema nitzschioides</i> Grun.		79500	16,0
март	<i>Sc. costatum</i> (Grev.) Cl.	239400	195000	81,5
	<i>Chaetoceros curvisetus</i> Cl.		100000	41,8
апрель	<i>Ch. curvisetus</i> Cl.	1065000	427000	41,1
	<i>Sc. costatum</i> (Grev.) Cl.		380000	35,7
	<i>Ch. socialis</i> Laud.		200000	18,8
май	<i>Rh. calcar avis</i> Schultze	1102000	336000	30,5
	<i>Sc. costatum</i> (Grev.) Cl.		280000	25,4
	<i>Ch. curvisetus</i> Cl.		137000	12,4
	<i>Th. nitzschioides</i> Grun.		150000	13,6
июль	<i>Ch. curvisetus</i> Cl.	986000	240000	24,3
	<i>Ch. socialis</i> Laud.		180000	18,3
	<i>Rh. calcar avis</i> Schultze		165000	16,7
	<i>Th. nitzschioides</i> Grun.		119000	12,1
октябрь	<i>Rh. calcar avis</i> Schultze	790000	276000	34,9
	<i>Th. nitzschioides</i> Grun.		200000	25,3
	<i>Ch. socialis</i> Laud.		130000	16,5
	<i>Ch. curvisetus</i> Cl.		80000	10,1

мае интенсивнее вегетирует *Ch. curvisetus* и *Rh. calcar avis*. Летом в планктоне преобладают эти же водоросли, численность *Sc. costatum* снижается. В осенний период плотность популяций определяется *Rh. calcar avis* и *Ch. curvisetus*. Относительно весенних проб, осенние отличались увеличением численности водоросли-доминанта *Th. nitzschoides*.

Таким образом, данные таблиц позволяют сделать вывод о том, что роль отдельных водорослей в планктоне неравноценна и каждая водоросль-доминант значима в определенный период года. Это отно-

Таблица 2.5. Доля водорослей-доминантов в общей численности диатомей в планктоне у очистных сооружений в 1997 году

Месяц	Водоросль-доминант	Численность		
		общая, экз/л	доми- нанта, экз/л	доля доми- нанта (%)
февраль	<i>Skeletonema costatum</i> (Grev.) Cl.	497200	315000	63,4
	<i>Thalassionema nitzschioides</i> Grun.		79500	16,0
март	<i>Sc. costatum</i> (Grev.) Cl.	239400	195000	81,5
	<i>Chaetoceros curvisetus</i> Cl.		100000	41,8
апрель	<i>Ch. curvisetus</i> Cl.	1065000	427000	40,1
	<i>Sc. costatum</i> (Grev.) Cl.		380000	35,7
	<i>Ch. socialis</i> Laud.		200000	18,8
май	<i>Rhizosolenia calcar avis</i> Schultze	1102000	336000	30,5
	<i>Sc. costatum</i> (Grev.) Cl.		280000	25,4
	<i>Ch. curvisetus</i> Cl.		137000	12,4
	<i>Th. nitzschioides</i> Grun.		150000	13,6
июль	<i>Ch. curvisetus</i> Cl.	986000	240000	24,3
	<i>Ch. socialis</i> Laud.		180000	18,3
	<i>Rh. calcar avis</i> Schultze		165000	16,7
	<i>Th. nitzschioides</i> Grun.		119000	12,1
октябрь	<i>Rh. calcar avis</i> Schultze	790000	276000	34,9
	<i>Th. nitzschioides</i>		200000	25,3
	<i>Ch. socialis</i> Laud.		130000	16,5
	<i>Ch. curvisetus</i> Cl.		80000	10,1

сится ко всем выбранным точкам наблюдений. Общим для точек отбора проб является идентичность состава видов-лидеров. Разница - в распределении ролей между ними в отдельные биологические сезоны.

2.3. Современное состояние представителей флоры высших сосудистых растений

Сохранение видового разнообразия растений в местах естественного произрастания является важнейшей задачей заповедника, решение которой возможно при выявлении степени редкости и организации контроля за состоянием популяций особо ценных и редких элементов флоры. Флористические исследования в заповеднике показали, что из 1172 видов высших сосудистых растений (в том числе 31 интродукента) 368 встречаются крайне редко, из них 102 вида имеют критически низкую численность популяций, произрастают единично или представлены несколькими десятками экземпляров, отмеченных не более чем в 1-3 местообитаниях (Миронова, Каменских, 1995). Следовательно, более 30% представителей флоры заповедника нуждаются в особой охране и находятся под угрозой исчезновения. В процессе восстановления растительного покрова, в условиях заповедного режима, наметилась тенденция уменьшения численности однолетних видов, сорного и полусорного разнотравья типа: *Capsella bursa-pastris*, *Cardaria draba*, *Diploxys muralis*, *Lycopsis arvensis*, *Torilis leptophylla*, *Vicia amphicarpa*, *Onobrychis transcaucasica*, *Physalis alkekengi*.

Не обнаружены в настоящее время места произрастания таких ранее единично встречающихся растений, как: *Centaurea cyanus*, *Crambe tatarica*, *Anchusa leptophylla*, *Blackstonia perfoliata*, *Goniolimon tataricum*, *Heracleum sibiricum*, *Sedum rubens*.

Критически низкая численность отмечается для: *Alyssum trichostachyum*, *Chorispora tenella*, *Coriandrum sativum*, *Erucastrum armorach*, *Euphorbia chamaesyce*, *Hibiscus trionum*, *Torularia torulosa*, *Tetragonolobus maritimus*, *Melampyrum argurocomum*, *Pedicularis sibthorpii*.

Многократные пороги кабанов, поголовье которых резко возросло при заповедном режиме, вызывают значительные преобразования в возрастной структуре популяций и изменения в онтогенетическом развитии, в частности, способах размножения у *Crocus angustifolius*, *Galanthus plicatus*, *Tulipa schrenkii*. Обоснованные выводы влияния кабана на структуру и состояние отдельных компонентов растительного покрова можно будет сделать лишь после многолетних стационарных

наблюдений, которые проводятся с 1984 года на участках произрастания особо охраняемых видов. Рекреационные нагрузки, в результате проведения в заповеднике экскурсионной деятельности, в целом негативного влияния на растительность не оказывают, хотя отдельные отрицательные факты имеются. Отмечается уничтожение вдоль экологической тропы *Limonium platyphyllum* и других дикорастущих декоративных трав; в результате бесконтрольного передвижения экскурсантов в районе хребта Магнитного, у Чертового пальца наблюдается полный сбой растительности, уплотнение, а местами эрозия почвенного покрова. На этой территории исчезло единственное место произрастания вида *Valeriana tuberosa*, ранее представленного всего тремя экземплярами; вытаптываются *Helichrysum arinarium*, *Tulpa schrenkii* редкие для Карадага. Вдоль морского побережья в бухтах сократилась численность *Astrodaucus littoralis*, *Crambe aspera*, *C. koktebelica*, а у западной границы заповедника, ниже источника урочище "Монастырчик" и южнее тропы к бассейну не отмечается произрастание популяции *Orchis punctulata*. Но не смотря на выше перечисленные негативные факты, в общем заповедный режим оказал положительное воздействие на сохранение редких видов растений. Значительно возросла численность почти всех представителей орхидных. Отмечается целый ряд новых мест произрастания для *Anacamptis pyramidalis*, *Lemodorum abortivum*, *Orchis purpurea*, *O. picta*, *O. tridentata*, *Ophrys oestrifera* по долинам и холмам, где ранее до заповедания территории нерегламентировано выпасался скот.

Контроль за изменением флористической ситуации в заповеднике, в первую очередь, обеспечивается за счет изучения численности и демографической структуры популяций особо охраняемых видов. Ранее составленные списки растений нуждающихся в особой охране (Миронова, 1994; Шатко, 1995; Миронова, Шатко, 1987) в настоящее время несколько устарели, потребовалось их уточнение и изменение. В результате флористических исследований текущего года был выделен 191 вид высших сосудистых растений нуждающихся в особом контроле за состоянием их популяций и углубленном изучении. К таким видам отнесено 65 эндемичных растений Крыма, произрастающих на Карадаге (Голубев, 1984), 43 вида растений занесенных в Красные книги (1978, 1980, 1984), 13 отмеченных в иных сводках о редких и исчезающих видах (1978, 1981; Крюкова, Лукс и др. 1980, 1980а).

Информация о растениях нуждающихся в особой охране представлена в таблице 2.6, где указывается число мест произрастания их на территории заповедника, численность в баллах и статус определения

тенденции динамических процессов в популяциях. Необходимо подчеркнуть, что в сохранении флористических ресурсов Юго-восточного Крыма и всей Украины Карадагский природный заповедник вносит огромный вклад. Учитывая высокое видовое разнообразие его региональной флоры, проведению мониторинга за состоянием особо охраняемых видов необходимо уделять первостепенное значение в научной тематике заповедника.

Таблица 2.6. Состояние популяций особо охраняемых видов сосудистых растений в Карадагском природном заповеднике на 1997 г.

N	Семейство, вид	Обоснование особой охраны						Характер популяций в заповеднике		
		Красные книги			Редкие для			Чис-	Чис-	
		Эндеми-Кры-ма	Иные свод ки		Кры-ма	Редкие для		ло	лен-	
			СССР	УССР		Кры-ра-дага	Ка-ра-дага	мес-тона-хож-ден.	ность в бал-лах	Ста-тус
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Aceraceae									
1	<i>Acer stevenii</i>	+	-	-	-	-	+	3	1	р
	Alliaceae									
2	<i>Allium firmotunicatum</i>	+	-	-	-	-	-	-	5	н
3	<i>Nectaroscordum meliophilum</i>	+	+	-	+	+	+	1	3	р
	Amaryllidaceae									
4	<i>Galanthus plicatus</i>	-	-	-	+	+	-	8	6	н
	Anacardiaceae									
5	<i>Pistacia mutica</i>	-	-	+	-	+	-	-	6	в
	Asclepidaceae									
6	<i>Vincetoxicum juzepczukii</i>	+	-	-	-	-	+	2	1	р

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	V. tauricum	+	-	-	-	-	+	4	2	p
	Aspleniaceae									
8	Asplenium									
	septentrionale	-	-	-	-	+	+	3	1	p
	Boraginaceae									
9	Onosma									
	polyphylla	-	+	-	-	+	-	-	5	h
	Capparaceae									
10	Cleome canescens	+	-	-	-	-	-	3	2	p
	Caryophyllaceae									
11	Cerastium									
	biebersteinii	+	+	+	-	+	+	4	3	p
12	Minuartia									
	adenotricha	+	-	-	-	-	+	6	3	p
13	M. euxima	+	-	-	-	-	+	4	2	p
14	Silene italica	-	-	-	-	+	+	3	3	p
15	S.									
	syreitschikowii	+	-	-	-	-	+	4	3	p
	Compositae									
	(Asteraceae)									
16	Anthemis									
	sterilis	+	-	-	-	-	-	-	5	h
17	A. tranzscheliana	+	-	-	-	-	-	3	5	h
18	C. caprina	+	-	-	-	-	-	-	5	h
19	C. sarandiniakiae	+	-	-	-	-	-	-	4	h
20	C. sterilis	+	-	-	-	-	-	-	6	h
21	Chamomilla									
	tzvelevii	+	-	-	-	-	+	2	1	y
22	Cirsium incanum	+	-	-	-	-	-	-	4	c
23	C. laniflorum	+	-	-	-	-	-	-	3	c
24	Filago arvensis	-	-	-	-	+	+	-	4	c
25	Galatella									
	biflora	-	-	-	-	+	+	3	2	c
26	Jurinea sordida	+	-	-	-	-	-	-	6	h
27	Lactuca chaixii	-	-	-	-	+	+	3	2	p
28	L. quercina	-	-	-	-	+	-	7	3	h

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Scorzonera cana	-	-	-	-	+	+	3	2	р
30	S. crispa	+	-	-	-	-	+	5	2	н
31	Senecio									
	jailicola	+	-	-	-	-	-	-	3	н
32	Taraxacum									
	serotinum	-	-	-	-	+	-	-	4	н
	Crassulaceae									
33	Sedum album	-	-	-	-	+	-	-	5	н
	Cruciferae									
	(Brassicaceae)									
34	Arabidopsis									
	thaliana	-	-	-	-	+	+	3	3	р
35	Crambe									
	koktebelica	-	-	-	+	+	+	4	1	у
36	C. steveniana	-	+	-	+	-	+	3	1	у
37	C. tataria	-	-	-	+	-	+	1	1	у
									7экз.	
38	Draba muralis	-	-	-	-	+	-	-	6	с
39	Matthiola									
	odoratissima	-	-	-	-	+	+	2	2	с
40	Torularia									
	torulosa	-	-	-	-	+	+	1	1	у
	Cucurbitaceae									
41	Eryonia alba	-	-	-	-	+	+	2	1	у
	Cupressaceae									
42	Juniperus									
	excelsa	-	+	+	+	+	-	-	6	в
	Cyperaceae									
43	Carex contigua	-	-	-	-	+	-	-	5	н
44	C. pallescens	-	-	-	-	+	+	3	3	р
45	C. praecox	-	-	-	-	+	-	-	6	н
	Dipsacaceae									
46	Cephalaria									
	demetrii	+	-	-	-	-	-	-	5	н

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Euphorbiaceae									
47	<i>Euphorbia</i>									
	humifusa	-	-	-	-	+	+	3	2	p
	Fumariaceae									
48	<i>Corydalis</i>									
	marschalliana	-	-	-	+	-	-	7	6	h
49	<i>Fumaria</i>									
	schleicheri	-	-	-	-	+	+	5	3	p
	Gentianaceae									
50	<i>Blackstonia</i>									
	perfoliata	-	-	-	-	+	+	1	1	y
51	<i>Centaurium</i>									
	spicatum	-	-	-	-	+	+	2	1	y
	Geraniaceae									
52	<i>Geranium</i>									
	divricatum	-	-	-	-	+	+	1	1	y
	Guttiferae									
	(Hypericaceae)									
53	<i>Hypericum</i>									
	hyssopifolium	-	-	-	-	+	+	7	2	b
	Hypericaceae									
54	<i>Hypocoum</i>									
	pendillum	-	-	-	-	+	+	1	1	y
	Iridaceae									
55	<i>Crocus</i>									
	angustifolius	-	+	+	+	-	-	-	6	h
56	<i>C. pallasii</i>	-	-	-	+	-	-	5	5	h
57	<i>C. speciosus</i>	-	-	+	+	+	+	3	3	h
	Juncaceae									
58	<i>Juncus</i>									
	articulatus	-	-	-	-	+	+	2	2	p
	Labiatae									
	(Lamiaceae)									
59	<i>Acinos</i>									
	rotundifolius	-	-	-	-	+	-	-	5	h

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	Salvia									
	scabiosifolia	+	-	-	+	-	+	9	3	н
	Scutellaria									
61	Sideritis									
	taurica	+	-	-	-	-	-	-	6	н
62	Stachys									
	atherocalyx	+	-	-	-	-	-	-	6	н
63	Teucrium jailae	+	-	-	-	-	+	4	4	н
64	Thymus callieri	+	-	-	-	-	-	-	6	в
65	Th.									
	marschallianus	-	-	-	-	+	+	1	1	у
66	Th.									
	pseudohumillimus	+	-	-	-	-	+	3	4	р
67	Ziziphora									
	taurica	+	-	-	-	-	-	-	5	н
	Liliaceae									
68	Colochicum									
	ancyrens	-	+	-	+	+	+	4	4	н
69	C. umbrosum	-	-	-	+	+	+	2	2	р
70	Eremurus jungei	+	-	+	-	-	+	1	4	н
71	Gagea callieri	+	-	-	-	+	-	-	4	н
72	G. taurica	-	-	-	-	+	-	-	4	н
73	Hyacinthella									
	leucophaea	-	-	-	+	+	+	1	1	у
74	Polygonatum									
	latifolium	-	-	-	-	+	-	-	5	н
75	Tulpa schrenkii	-	+	+	+	-	+	6	5	с
	Limoniaceae									
76	Goniolimon									
	tauricum	+	-	-	-	-	+	1	1	у
	Linaceae									
77	Linum									
	marschalliana	+	-	-	-	-	+	3	2	р
78	L. pallasianum	+	-	-	-	+	+	7	2	в
	Loranthaceae									
79	Viscum album	-	-	-	+	-	+	3	1	р

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	<i>O. pumotulata</i>	-	+	+	+	+	+	1	1	y
									38	
									экз.	
101	<i>O. purpurea</i>	-	+	+	+	+	+	12	3	h
									950	(B)
									экз.	
102	<i>Orchis simia</i>	-	-	+	-	-	+	2	3	h
									550	
									экз.	
103	<i>O. tridentata</i>	-	-	+	-	-	-	-	4	B
									<3000	
104	<i>Platanthera</i>									
	<i>chlorantha</i>	-	-	+	-	-	+	3	2	p
									<300	
									экз.	
	Paeoniaceae									
105	<i>Paeonia taurica</i>	-	-	+	+	+	-	-	4	B
106	<i>P. teaufolia</i>	-	+	+	+	+	-	-	5	B
	Papaveraceae									
107	<i>Chelidonium</i>									
	<i>majus</i>	-	-	-	-	+	+	2	2	y
108	<i>Glaucium</i>									
	<i>corniculatum</i>	-	-	-	-	+	+	3	1	y
109	<i>G. flavum</i>	-	+	-	-	+	+	2	1	y
									35	
									экз.	
110	<i>Roemeria hybrida</i>	-	-	-	-	+	+	2	1	p
	Papilionaceae									
	(Fabaceae)									
111	<i>Anthyllis</i>									
	<i>taurica</i>	+	-	-	-	-	+	-	3	p
112	<i>Astragalus</i>									
	<i>arnacantha</i>	+	-	-	+	-	-	-	6	h
113	<i>A. dealbatus</i>	+	-	-	-	-	+	2	2	p
114	<i>A. similis</i>	+	-	-	-	-	+	2	2	p
115	<i>A. subuliformis</i>	-	-	-	-	+	+	4	3	p

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	A. utriger	+	-	-	-	+	+	5	3	в
117	A. suprapilobus	+	-	-	-	-	-	-	6	н
118	A. tarchancutius	+	-	-	-	+	+	2	1	у
119	Genista albida	+	-	-	-	+	+	-	3	н
120	G. depressa	+	-	-	-	+	+	-	4	н
121	G. godetii	+	-	-	-	+	+	3	2	р
122	Lens ervoides	-	-	-	-	+	+	2	2	с
123	Onobrychis									
	pallasii	+	-	-	-	-	+	7	3	н
124	O. transcaucasica	+	-	-	-	-	+	1	1	у
125	Pisum elatius	-	-	-	-	+	+	3	2	с
126	Vicia ervilia	-	-	-	-	+	+	3	3	с
127	V. pilosa	-	-	-	-	+	+	1	1	у
	Poaceae									
128	Aegilops									
	biuncialis	-	-	-	-	+	-	-	6	с
129	A. ovata	-	-	-	-	+	-	-	5	с
130	Agropyron									
	ponticum	+	-	-	-	+	-	-	6	н
131	Apera maritima	-	-	-	-	+	+	3	4	р
132	Brachypodium									
	pinnatum	-	-	-	-	-	+	2	2	у
133	Elytrigia									
	nodosa	+	-	-	-	-	-	-	6	н
134	E. strigosa	+	-	-	-	+	+	-	4	р
135	Gaudinopsis									
	macra	-	-	-	-	+	-	-	5-6	с
136	Phleum pratense	-	-	-	-	+	+	-	3	р
137	Polypogon									
	simiverticill-									
	latus	-	-	-	-	-	+	2	2	р
138	Stipa capillata	-	+	-	-	+	-	-	6	в
139	S. lithophila	+	+	+	+	+	-	-	6	в
140	S. lessingiana	-	-	+	-	+	-	-	6	в
141	S. pulcherrima	-	-	-	+	-	-	-	6	в

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142	S. syreistchikowii	-	+	-	-	+	+	-	5	В
143	S. ucrainica	-	-	+	+	-	-	-	6	В
	Polygonaceae									
144	Rumex scutatus	-	-	-	-	+	+	2	1	р
145	Potamogeton lucens	-	-	-	-	+	+	1	1-2	у
	Ranunculaceae									
146	Adonis vernalis	-	+	-	+	-	+	5	5	В
147	Consolida divaricata	-	-	-	-	+	-	-	4	Н
148	Delphinium fissum	-	+	-	+	+	-	-	5	В
149	Garidella nigellastrum	-	-	-	-	+	+	2	1	у
150	Pulsatilla taurica	+	-	-	-	-	-	4	6	В
151	Myosurus minimus	-	-	-	-	+	+	1	1	у
									47	
									экз.	
	Rosaceae									
152	Cotoneaster tauricus	+	-	-	-	-	-	-	6	В
153	Crataegus ceratocarpa	+	-	-	-	-	-	-	5	Н
154	C. diphyrena	+	-	-	-	-	-	-	5	Н
155	C. karadaghensis	+	-	-	-	-	-	-	5	Н
156	C. pojarkovae	+	+	-	+	+	+	2	2	р
									179	
									экз.	
157	C. sphaenophylla	+	-	-	-	-	-	-	5	Н
158	C. stankovii	+	-	-	-	+	+	2	3	р
159	Potentilla callieri	-	-	-	-	+	-	-	5	Н
160	P. chrysantha	-	-	-	-	+	+	1	1	у

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
161	P. geoides	+	-	-	-	-	+	2	1	у
162	P. umbrosa	+	-	-	-	-	+	3	4	в
163	Rosa pygmaea	+	-	-	-	-	+	3	2	р
164	Rubus tauricus	+	-	-	-	-	-	5	5	н
165	Sorbus domestica	-	-	-	+	-	+	-	3	р
166	S. torminalis	-	-	-	+	+	-	-	4	н
	Rubiaceae									
167	Asperula kotovii	+	-	-	-	-	+	2	1	р
168	Rubia tinctorum	-	-	-	-	+	+	2	1	р
	Scrophulariaceae									
169	Melampyrum									
	argyrocomum	-	-	-	-	+	+	1	1	у
170	Orphananthus lutea	-	-	-	-	+	-	-	6	в
171	Phularia goldena	+	-	-	-	+	+	2	1	у
172	Veronica									
	austriaca	-	-	-	-	+	-	-	4	н
173	Veronica									
	beccabunga	-	-	-	-	+	+	2	1	у
174	V. taurica	+	-	-	-	-	-	-	5	н
175	Notholena									
	marantae	-	-	-	-	+	+	1	1	р
	Solanaceae									
176	Solanum									
	zelenetzki	+	-	-	-	-	+	3	1	с
	Tiliaceae									
177	Tilia dasystyla	+	-	-	-	-	+	1	1	у
									7 экз	
	Umbelliferae									
178	Bupleurum affine	-	-	-	-	+	+	2	2	р
	affine									
179	B. brachiatum	-	-	-	-	+	-	-	6	н
180	B. gerardii	-	-	-	-	+	+	-	4	с
181	B. tenuissimum	-	-	-	-	+	+	-	6	н
182	Coriandrum									
	sativum	-	-	-	-	+	+	1	1	у

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
183	<i>Pimpinella</i>									
	<i>tragicum</i>	+	-	-	-	-	-	-	5	н
184	<i>Rumia</i>									
	<i>crithmifolia</i>	+	-	-	-	-	-	-	5	н
185	<i>Seseli tortuosum</i>	-	-	-	-	+	-	-	5	н
	Valerianaceae									
186	<i>Valerianella</i>									
	<i>carinata</i>	-	-	-	-	+	-	-	6	с
187	<i>V. costata</i>	-	-	-	-	+	-	-	6	с
188	<i>V. lasiocarpa</i>	-	-	-	-	+	+	3	3	с
	Viciaceae									
189	<i>Vicia suavis</i>	-	-	-	-	+	+	-	2	в
	Vitaceae									
190	<i>Vitia sylvestris</i>	-	-	-	+	+	+	2	1	с

Примечание: 1) Число местонахождений не указывается для видов произрастающих почти по всей территории без четкого ограничения популяций; 2) Численность приводится в баллах из расчета: 1-отмечено до 100 экз. вида; 2- от 100 до 500; 3- от 500 до 1000; 4- от 1000 до 5000; 5- от 5000 до 1 000 000; 6- свыше 1 000 000 экз.; 3) Статус определяет: р-вид очень редкий, но численность стабильна; с-численность сокращается; у-крайне малочисленный вид, под угрозой исчезновения; н-состояние популяций нормальное, численность значительно выше критической; в-состояние популяций нормальное, численность возрастает.

Литература.

1. Голубев В.Н. Биологическая флора Крыма. (Рук. Деп. в ВИНТИ 7.08.84 N 5770. 84 Деп.)// Ялта, 1984. 217 с.
2. Каталог редких, исчезающих и уничтожаемых растений флоры Крыма рекомендуемых для заповедной охраны / Ялта: ГНБС, 1976. 20с.
3. Красная книга. Дикорастущие виды флоры СССР, нуждающиеся в охране / Л.: Наука, 1975. - 203 с.
4. Красная книга СССР. М.:Лесная пром-сть, 1978. - 500 с.
5. Красная книга СССР. М.:Лесная пром-сть, 1984. - 448 с.

6. Красная книга УССР. Киев.: Наукова думка, 1980. - 500 с.
7. Косых В.М., Голубев В.Н. Современное состояние популяций редких, исчезающих и эндемичных растений горного Крыма. (Рук. Деп. в ВИНТИ N 3360 - 83 Деп.) // Ялта, 1983. - 118 с.
8. Крюкова И.В., Лукс Ю.А., Привалова А.А. и др. Растения // Редкие растения и животные Крыма // Симферополь "Таврия", 1988. - С. 23-80.
9. Методические указания к популяционно-количественному и эколого-биологическому изучению редких, исчезающих и эндемичных растений Крыма / Сост. В.Н. Голубевым, Е.Ф. Молчановым. Ялта: ГНБС, 1978. - 41 с.
10. Методические указания по изучению редких и исчезающих растений флоры Крыма / Сост. В.Н. Голубев, В.М. Косых. Ялта: ГНБС, 1980. - 30 с.
11. Миронова Л.П. Биологические аспекты стационарного контроля (Фитоценотический контроль) // Заключительный отчет по теме: "Разработать и внедрить систему стационарного контроля наземных экосистем в условиях Карадагского государственного заповедника. (Рукопись) / Карадаг, 1984, - С. 36-37, 116-140.
12. Миронова Л.П., Шатко В.Г. Популяционное изучение редких растений в Карадагском заповеднике // Редкие виды заповедников СССР / -М., 1987. - С. 95-108.
13. Редкие и исчезающие виды флоры СССР, нуждающиеся в охране. Л.: Наука, 1981. - 263 с.
14. Шатко В.Г. Редкие и исчезающие виды растений природной флоры Крыма, обитающие на территории Карадагского государственного заповедника // Летопись природы 1985 г. Т.2, кн. 2. (Рукопись.) / Карадаг, 1985. - С. 39-51.

2.4. Плодоношение основных лесообразующих пород

Наблюдения за плодоношением основных автохтонных лесообразующих пород осуществлялись в коренных лесных формациях Карадагского заповедника, а также, для сравнения, в сходных по составу древостоях заказника "Новый Свет".

Наблюдения проводились на постоянных пробных площадях, основные лесоводственные характеристики которых приводятся в таблице 2.7.

Фенология исследуемых видов осуществлялась по Бородиной Н.А. (1) - для хвойных, Иваненко Б.И. (2) - для лиственных. Оценку цве-

Таблица 2.7. Список лесных постоянных пробных площадей, на которых проводились наблюдения за плодоношением древесных пород

NN ппп/ уро- чище	Расположение		Пло- щадь, га	Состав насаждения	Возраст	Степень сомкну- тости крон	Происхож- дение
	квартал	выдел					
2	12	2	0,15	6Дс2Я1Лпм1Брк+Гб ед. Кп	80	1,60	порослевое
3	42	13	0,40	9Мжв1Фст ед. Дп	160	0,75	семенное
Н. Св	42	9	0,40	10Мжв	110	0,65	семенное
7	5	7	0,10	9Дс1Я ед. Кп, Брк, Гб	70	1,80	порослевое
8	15	3	0,06	10Дп ед. Я, Кп, В, Алч	80	1,50	порослевое
9	25	2	0,10	10Дс	80	1,30	порослевое
11	18	3	0,07	10Дп ед. Мжк, Гб	60	1,40	порослевое
12	18	8	0,08	9Дп1Гб ед. Я, Мжк	70	1,20	порослевое
14	39	13	0,22	9Фст1Дп ед. Грл, Мжв	80	0,90	семенное
16	37	15	0,15	10Фст	50	0,90	семенное
17	31	16	0,20	10Спц+Дп	38	1,10	культуры
Н. Св	43	25	0,20	9Спц1Дп	110	1,20	семенное

тения и плодоношения давали по шкале Каппера (3). Учет плодоношения и качество семян определяли по Корчагину (4).

Данные по плодоношению и семеношению основных лесообразующих пород приводятся в таблице 2.8.

2.4.1. Плодоношение *Pinus pithuusa*

Учет шишек проводили в марте-апреле на 5 модельных деревьях, максимально приближенных к средним таксационным показателям древостоя (1).

Наряду с урожайностью, у *Pinus pithuusa* определялись биометрия шишек и семян, полнозернистость семян, выход семян от массы шишки и выход ядра от массы семени (3). Данные по биометрии, полнозернистости и весовым характеристикам семян приведены в таблице 2.9.

2.4.2. Плодоношение *Juniperus excelsa*

Учет и сбор шишкоягод осуществлялся на стадии их физиологической зрелости - в ноябре месяце - по методу модельных деревьев (5) с учетом полового типа дерева (6). На контрольных деревьях собирался весь урожай шишкоягод с учетом его распределения по ярусам и рубам в пределах кроны (табл. 2.10).

Дополнительно для *Juniperus excelsa* определялся средний процент пораженности шишкоягод насекомыми. Для Карадагской популяции он составил в 1997 г. 14,8%, для Нового Света - 31,9%.

2.4.3. Плодоношение *Pistacia mutica*

Учет урожая *Pistacia mutica* проводился на 5 модельных деревьях, максимально приближенных к значениям среднего дерева, произрастающего на пробных площадях. У плодов определялись биометрия и весовые значения семян, полнозернистость и количество полноценных семян в пересчете на 1 гектар насаждения. Данные по плодоношению *Pistacia mutica* приведены в таблице 2.8.

2.4.4. Плодоношение *Quercus pubescens* и *Quercus petraea*

Учет желудей у *Quercus pubescens* и *Quercus petraea* проводился в пределах пробных площадей (табл. 2.8) на элементарных площадках размером 1 м² в количестве 16 штук, размещенных под кроной модельных

Таблица 2.8. Плодоношение и семеношение древесных видов на постоянных пробных площадях в 1997 г.

Название растения	NN про	Оценка		Среднее число:			Колич. плодов на 1 га тыс. шт.	Средняя масса 1000 шт семян
		бы/ уро чище	цве те ния	пло доно шен.	плодоно сая. дер за 1 га	плодов или шишек на 1 дерево		
						полноцен ных се- мян (%)		
Pinus pithyusa	17	5	4	1523	16	68,1	1016,7	61,9
	Н. Св	5	4	964	24	76,2	428,0	60,5
Juniperus exoelsa	3	5	3	256	576	5,2	15,3	15,5
	Н. Св	5	2	220	1471	5,9	20,9	17,1
Pistacia mutica	14	5	4	280	4323	20,4	247,2	78,4
	16	5	3	456	1667	9,0	72,6	72,6
Quercus pubescens	8	5	5	3583	1248	37,0	780	3200
	11	5	5	3200	916	46,4	573	3350
	12	5	5	2887	1124	40,3	703	3420
Quercus petraea	2	5	4	2167	768	41,8	480	3090
	7	5	4	2340	704	47,2	440	2950
	9	5	5	2010	885	43,4	553	2890

Таблица 2.9. Средние биометрические показатели у *Pinus pithusa* в 1997 г.

Показатели	Карадаг	Новый Свет
Длина шишек (см)	6,9	7,0
Диаметр у основания шишки (см)	4,4	4,3
Выход семян из одной шишки (шт)	66,0	64,0
Выход семян от массы шишки (%)	9,3	9,4
Размеры семян (мм):		
длина	7,4	7,1
диаметр у основания	4,0	4,2
Выход ядра от веса семени (%)	36,1	35,2

Таблица 2.10. Распределение урожая шишкоягод *Juniperus excelsa* по румбам и ярусам в пределах кроны деревьев.

Ярус кроны	Количество шишкоягод по румбам кроны				Всего в ярусе	
	Запад	Север	Восток	Юг	Штук	%
Верхний	46	-	52	115	213	9,2
Средний	285	364	364	688	1440	62,5
Нижний	163	48	151	288	650	28,3

Сбор желудей осуществлялся через каждые 3-4 дня в период их опадения.

Для *Quercus pubescens* и *Quercus petraea* дополнительно определялись степень поврежденности желудей грибами, насекомыми и животными в период диссеминации. Данные о качестве желудей приводятся в таблице 2.11.

Таблица 2.11. Качество желудей на постоянных пробных площадях в 1997 г.

Вид	NN ппп	Кол-во плодов на учетн. пл.				
		Всего шт.	В том числе (%):			
			поврежденных:			здо- ро- вых:
			гри- бами	насе- ком.	живот- ными	
<i>Quercus pubescens</i>	8	1248	25	35	3	37
	11	916	19	29	6	46
	12	1124	20	32	8	40
В среднем по породе		1096	21	32	6	41
<i>Quercus petraea</i>	2	768	21	29	9	41
	7	704	15	25	13	47
	9	885	16	27	14	43
В среднем по породе		786	17	27	12	44

Литература

1. Бородина Н.А. Методика фенологических наблюдений над растениями семейства Pinaceae // Бюл. ГБС. - 1965. - Вып. 57. - С. 11-19.
2. Иваненко Б.И. Фенология древесных и кустарниковых пород. М.: Изд. с/х лит-ры, 1962. - 183 с.
3. Игнатенко М.М. Семеношение и семенная продуктивность *Pinus sibirica* // В сб. Биология цветения и семенная продуктивность. М.: Наука. - 1985. - С. 3-8.
4. Каппер В.Г. Об организации ежегодных систематических наблюдений над плодоношением древесных пород // Труды по лесному опытному делу. Л.: 1930. - Вып. 8. С. 16-19.
5. Корчагин В.В. Методы учёта семеношения древесных пород и лесных сообществ // Полевая геоботаника, М.-Л.: Изд. АН СССР. - 1960. - Т. 2. - С. 41-32.
6. Некрасова Т.П. Методы оценки и прогноза урожаев семян кедра сибирского. Новосибирск: Изд. СО АН СССР. - 1960. - 35 с.

3. Фауна и животное население

3.1. Насекомые: чешуекрылые

3.1.1 Новые виды

Семейство Psychidae

1. *Eumelasina pliginskii* Kozh. Ранее чехлики гусениц данного вида неоднократно в разные годы последнего десятилетия находились нами на западном склоне горы Легенер в биотопах, представляющих собой скальные выходы на высоте 300-400 м н.у.м. Во время экспедиционной работы в заповеднике весной-в начале лета 1997 года аспиранта Института зоологии НАН Украины Е.В.Рутьяна, углубленно занимающегося изучением Psychidae, им были получены данные, свидетельствующие о широком распространении данного вида на Карадаге. В частности, чехлики гусениц *E. pliginskii* были найдены во многих участках склонов южной и юго-западной экспозиций хребта Беш-Таш, Тумановой балки на небольших высотах в местообитаниях со слабо развитым и имеющим явно нагорно-ксерофитный облик растительным покровом и, как правило, щепнистым покрытием грунта.

2. *Psychidea alba* Sln. Чехлики гусениц данного вида были обнаружены на территории Карадагского заповедника дважды: во второй половине мая 1989 года на полянах западного склона хребта Сюрю-Кая в лугово-степных биотопах (Будашкин) и в начале мая 1997 года в остепненных биотопах юго-западного склона горы Святая (у границы верхней миндальной роши) (Рутьян).

Семейство Noctuidae

1. *Nadena albimacula* Bkh. 1 самка, 11.06.97, на свет. Стации обитания не выяснены (по-видимому, мигрант).

3.1.2 Состояние видов

Материалы по срокам регистрации и численности чешуекрылых приводятся в таблице 3.1.

Таблица 3.1. Состояние видов чешуекрылых

N п/п	Название вида	Крайние да- ты регист- рации	Макс. чис- ленность экз/ед. учета	Дата макси- мальной численности
1	2	3	4	5
1	<i>Phigalia pilosaria</i> Den. et Schiff.	20.02-3.04	21	26.02
2	<i>Apocheima hispidaria</i> Den. et Schiff.	21.02-1.04	10	4.03
3	<i>Ocnogyna parasita</i> Hbn.	2.03-1.04	8	13.03
4	<i>Spudaea rutilicilla</i> <i>pontica</i> Kl.	12.12-8.05	34	1.04
5	<i>Alsophila aescularia</i> Den. et Schiff.	3.03-23.04	5	1.04
6	<i>Biston strataria</i> Hfn.	26.02-23.04	220	1.04
7	<i>Agriopsis leucophaeria</i> Den. et Schiff.	20.01-7.03	4	20.01
8	<i>Nyssia zonaria</i> Den. et Schiff.	3.03-1.04	1	3, 7.03, 1.04
9	<i>Agriopsis marginaria</i> Bkh.	1.04	1	1.04
10	<i>Orthosia cruda</i> Den. et Schiff.	31.03-7.05	25	1.04
11	<i>Europhila badiata</i> Den. et Schiff.	1-22.04	2	22.04
12	<i>Diurnea fagella</i> Den. et Schiff.	2.04	1	2.04
13	<i>Orthosia stabillis</i> Den. et Schiff.	1.04-8.05	7	25.04
14	<i>Cerastis rubricosa</i> Den. et Schiff.	2-21.04	1	2, 19, 21.04
15	<i>Orthosia opima</i> Hbn.	3.04-8.05	7	23.04, 1.05
16	<i>Orthosia gothica</i> L.	22.04-10.05	7	1, 3.05
17	<i>Ptilocephala plumi-</i> <i>fera</i> Ochs.	31.03-30.04	6	3.04

1	2	3	4	5
18	<i>Orthosia miniosa</i> Den. et Schiff.	1.04-8.05	8	23.04
19	<i>O. incerta</i> Hfn.	21.22.04	1	21.22.04
20	<i>Tomares callimachus</i> Ev.	31.03-13.05	15	3.04
21	<i>Egira conspiciellaris</i> L.	25.04-19.05	15	1.05
22	<i>Pseudoullia asinana</i> Hbn.	22.04-17.05	15	1.05
23	<i>Dasypolia templi</i> Thnbg.	29.03-1.04	1	29.03, 1.04
24	<i>Thyria jacobaeae</i> L.	10.05	1	10.05
25	<i>Charanyca trigrammica</i> Hfn.	14.05-13.06	12	23.05
26	<i>Phaneta pauperana</i> Dup.	17.04-8.05	4	3.05
27	<i>Cybolomia dulcinalis</i> Tr.	12.05-2.06	4	17.05
28	<i>Cnephasia communana</i> H.-S.	3.04-25.05	12	8.05
29	<i>Epicalia villica</i> L.	14.05-21.06	24	26.05
30	<i>Proterebla phegea</i> Bkh.	2.05-28.05	5	13.05
31	<i>Autocharis cardamines</i> L.	3.04-2.06	26	3.05
32	<i>Filatima spurcella</i> H.-S.	6.05-8.06	4	18.05
33	<i>Hadena luteago</i> Den. et Schiff.	14.05-12.06	3	23.05
34	<i>Eupithecia schiefereri</i> Boh.	13.05-23.05	1	9 дней
35	<i>Elachista pollutella</i> Dup.	22.04-9.05	5	6.05
36	<i>Cryptocoehylis conjunc-</i> tana Mann	1-6.05	1	1, 6.05
37	<i>Aphelia stigmatana</i> Ev.	26.05-15.06	6	28.05
38	<i>Notocelia cynosbatel-</i> la L.	18.05-28.05	5	23.05
39	<i>Pyrgus sidae</i> Esp.	20.05-10.06	3	28.05
40	<i>Serraca punctinalis</i> Sc.	17.05-23.06	12	4.06

1	2	3	4	5
41	<i>Syntomis nigricornis</i>			
	Alph.	22.05-10.07	28	8.06
42	<i>Lobesia crimea</i> Flkv.	25.05-10.06	3	31.05
43	<i>Leioptilus inulae</i> Z.	3.06	1	3.06
44	<i>Klimeschia transverse-</i>			
	lla Z.	14.05	1	14.05
45	<i>Amaurophanes stigmo-</i>			
	salis H.-S.	18.05-26.06	30	28.05
46	<i>Hedya nubiferana</i> Hw.	16.05-1.07	20	6.06
47	<i>Cnephasia incertana</i>			
	Tr.	17.05-22.06	16	28.05
48	<i>Aethes kazyi</i> Raz.	18.05	1	18.05
49	<i>Tinagma collumbella</i>			
	Stgr.	19.05	2	19.05
50	<i>Ammobiota festiva</i> L.	29.04	1	29.04
51	<i>Ethmia fumidella</i> Wck.	22.04	1	22.04
52	<i>Idaea sericeata</i> Hbn.	25.05-5.06	2	30.05
53	<i>Zygaena sedi</i> F.	9-19.06	12	12.06
54	<i>Tortrix viridana</i> L.	4-23.06	60	11.06
55	<i>Zygaena punctum</i> Ochs.	24.05-12.07	40	8.06
56	<i>Zygaena loti</i> Den. et			
	Schiff.	5.06-1.07	5	10.06
57	<i>Noctua pronuba</i> L.	21.05-5.10	280	12.06
58	<i>Catacrobasis obtusel-</i>			
	la Hbn.	10.06-18.07	60	19.06
59	<i>Platyptilia mianthodac-</i>			
	tyla Z.	4-20.06	3	8.06
60	<i>Ochropleura forcipula</i>			
	Den. et Schiff.	4-24.06	6	16.06
61	<i>Brenthis hecate</i> Den.			
	et Schiff.	10.06-15.07	25	19.06
62	<i>Periphanes treischkei</i>			
	Friv.	4-11.06	2	4.06
63	<i>Ochlodes venatus</i> Brem			
	et Grey	10.06-22.07	60	23.06
64	<i>Allemma loeflingiana</i> L.	4.06-25.06	800	12.06

1	2	3	4	5
65	<i>Conchia mundataria</i> Stoll	14-18.06	1	14, 18.06
66	<i>Thymelicus lineola</i> Ochs.	10.06-24.07	25	23.06
67	<i>Oncocera faecella</i> Z.	15.06-21.07	6	24.06
68	<i>Melanargia galathea</i> L.	16.06-8.08	12	4.07
69	<i>Zygaena carniolica</i> Scop.	16.06-9.08	35	20.06
70	<i>Satyrus ferula</i> F.	10.06-19.07	120	20.06
71	<i>Comibaena bajularia</i> Den. et Schiff.	12.06-20.06	3	14.06
72	<i>Oligia strigilis</i> Cl.	12.06-30.06	25	20.06
73	<i>Zygaena ephialtes</i> L.	18.06-15.07	3	23.06
74	<i>Catocala nymphagoga</i> Esp.	11.06-23.07	164	26.06
75	<i>Nola cicatricalis</i> Tr.	22.04-17.05	25	3, 6.05
76	<i>Eupithecia dodoneata</i> Gn.	25.04-26.05	30	11-13.05
77	<i>Malacosoma neustria</i> L.	17.06-1.07	6	23.06
78	<i>Lithostege griseata</i> Den. et Schiff.	6-11.05	1	6, 11.05
79	<i>Myelois tetricella</i> Den. et Schiff.	13.05-12.06	20	14.05
80	<i>Pterolonche inspersa</i> Stgr.	вид не регистрировался		
81	<i>Muschampia proto</i> Esp.	30.07-8.09	25	10.08
82	<i>Megasis rippertella</i> Z.	2-18.05	1	2, 13, 18.05
83	<i>Elachista atricomella</i> Stt.	9-15.06	3	11.06
84	<i>Elachista kimmeriella</i> Sin. et Bud.	9-12.06	2	10.06
85	<i>Sophronia chilonella</i> Tr.	28.06-10.07	5	30.06
86	<i>Hipparchia fagi</i> Scop.	16.06-2.08	4	28.06
87	<i>Pyrgus cynarae</i> Rbr.	18.06-15.07	6	28.06
88	<i>Idaea politata</i> Hbn.	19.06-14.07	12	29.06

1	2	3	4	5
89	<i>Mirificarma eburnella</i> Den. et Schiff.	9.06-2.07	5	20.06
90	<i>Metanarsia modesta</i> Stgr.	11.06-10.08	8	4.07
91	<i>Cidaria fulvata</i> Forst.	16.06-20.06	2	18.06
92	<i>Thalera fimbrialis</i> Scop.	16.06-12.07	2	26, 29.06
93	<i>Croesia forsskaleana</i> L.	23.06-20.07	3	29.06
94	<i>Cnaemidophorus rhodo-</i> <i>dactylus</i> Den. et Schiff.	28.06	1	28.06
95	<i>Eucosma conformana</i> Mn.	28.06-5.07	2	30.06
96	<i>Eudemis profundana</i> Den. et Schiff.	28.06-10.08	12	10.07
97	<i>Lymantria dispar</i> L.	10.07-5.08	4	22.07
98	<i>Agrodiaetus budashkini</i> Kolev et De Prins	25.06-7.08	4	14.07
99	<i>Agrodiaetus poseidon</i> krymaeus Schelj.	22.06-9.08	45	5.07
100	<i>Agdistis adactyla</i> Hbn.	18.06-4.08	8	10.07
101	<i>Stomopterix detersella</i> Z.	20.06-24.09	25	25.07
102	<i>Odites lutrella</i> Costa	22.06-12.08	18	12.07
103	<i>Lysandra coridon</i> Poda	4.08	2	4.08
104	<i>Catocala hymenea</i> Den. et Schiff.	25.06-10.08	8	16.07
105	<i>Zygaena laeta</i> Hbn.	4.08	1	4.08
106	<i>Ancylolomia palpella</i> Den. et Schiff.	24.07-18.09	26	25.08
107	<i>Phtheochroa pulvillana</i> H.-S.	9-11.06	1	9, 11.06
108	<i>Phtheochroa sociana</i> karadaghiana Bud.	21.05-9.06	2	23.05
109	<i>Ephesia diversa</i> Hbn.-G.	вид не регистрировался		
110	<i>Eilema pseudocomplanum</i> Daniel	вид не регистрировался		
111	<i>Crocallis elingnaria</i> L.	29.07-19.09	3	28.08

1	2	3	4	5
112	<i>Eupithecia karadaghensis</i> Mir.	1.08-14.08	6	10.08
113	<i>Talpophila matura</i> Hfn.	6.08-16.10	30	16.09
114	<i>Agriphila inguinatella</i> Den. et Schiff.	6.08-30.09	12	12.09
115	<i>Cydia amplana</i> Hbn.	18.08-5.09	3	1.09
116	<i>Actenia brunnealis</i> Tr.	18.08-9.09	4	2.09
117	<i>Lasiocampa trifolii</i> L.	19.09	1	19.09
118	<i>Cochylis roseana</i> Hw.	26.08-8.09	3	3.09
119	<i>Gymnancila hornigii</i> Ld.	24.08-19.09	3	4.09
120	<i>Acleris rhombana</i> Den. et Schiff.	23.08-22.11	4	18.10
121	<i>Xanthia fulvago</i> Cl.	5.-29.10	12	15.10
122	<i>Agriphila tolli</i> Blez.	26.08-22.09	4	16.09
123	<i>Phtheochroa fulvicinctana</i> Const.	28.08-14.09	2	8.09
124	<i>Cochylimorpha halophilana</i> Chr.	30.08-12.09	2	8.09
125	<i>Evergestis serratalis</i> Stgr.	8.09-5.10	2	19.09
126	<i>Euxoa obelisca</i> Den. et Schiff.	28.08-14.10	3	19.09
127	<i>Xestia xanthographa</i> Den. et Schiff.	12.09-6.10	4	22.09
128	<i>Eucosma agnathana</i> Chr.	16.09	1	16.09
129	<i>Perizoma bifaciata</i> Hw.	12.09	1	12.09
130	<i>Mythimna punctosa</i> Tr.	26.09	1	26.09
131	<i>Triodia sylvina</i> L.	12-22.09	4	19.09
132	<i>Evergestis nomadalis</i> Ld.	8-22.09	4	16.09
133	<i>Luperina taurica</i> Kl.	12.09-6.10	5	18.09
134	<i>Agrotis obesa</i> Bsd.	17.09-6.10	2	26.09
135	<i>Episema scoriacea</i> Esp.	22.09-12.10	6	28.09
136	<i>Agrochola macilenta</i> Hw.	14.10-3.12	8	27.11
137	<i>Allophytes oxyacantha</i> L.	14.10-12.11	2	15.10.6.1 1
138	<i>Dryobotodes eremita</i> F.	26.09-26.11	8	8.10

1	2	3	4	5
139	<i>Polymixis canescens</i>			
	Dup.	16.09-16.11	8	24.09
140	<i>Agrochola helvola</i> L.	14.10-2.12	2	5.11
141	<i>A. lichnidis</i> Den. et			
	Schiff.	18.10-5.12	10	6.11
142	<i>Polymixis rufocincta</i>			
	Hbn.	21.11-3.12	4	21.11
143	<i>Scotochrosta pulla</i> Den.			
	et Schiff.	12.09-18.11	4	26.09
144	<i>Eupithecia variostriga-</i>			
	ta Alph.	16.09-20.10	6	27.09
145	<i>Episema glaucina</i> Esp.	28.09-9.10	2	28.09
146	<i>Agrochola nitida</i> Den.			
	et Schiff.	5.10	1	5.10
147	<i>Dryobotodes roboris</i>			
	Hbn. -G.	14.09-24.11	12	4.10
148	<i>Trachysmia kenneli</i> Obr.	вид не регистрировался		
149	<i>Atethmia ambusta</i> F.	22-23.09	1	22.23.09
150	<i>Mesogona acetosellae</i>			
	Den. et Schiff.	26.09-13.10	1	26.09, 3.13.10
151	<i>Atethmia centrargo</i> Hw.	22.09-13.10	4	26.09
152	<i>Aporophila nigra</i> Hw.	26.09-18.11	12	8.10
153	<i>Xestia cohaesa</i> H.-S.	26.09-5.10	2	4.10
154	<i>Ammonoconia caecimacula</i>			
	Den. et Schiff.	8-17.10	1	8.17.10
155	<i>Dichonia aprilina</i> L.	5.10-12.12	2	17.10
156	<i>Crocallis tusciaria</i> Bkh.	10.10-18.11	4	14.10
157	<i>Colotois pennaria</i> L.	4.11-18.11	4	10.11
158	<i>Ulochlaena hirta</i> Hbn.	3.11	1	3.11
159	<i>Chloroclysta siterata</i>			
	Hfn.	14.11-12.12	6	18.11
160	<i>Deuterotinea casanella</i>			
	Ev.	2-13.12	2	12.12
161	<i>Agriopsis bajaran</i> Den.			
	et Schiff.	19.11-21.12	8	21.11

1	2	3	4	5
162	<i>Alsophila quadripunctaria</i> Esp.	27.11-5.12	1	27.11, 5.12
163	<i>Erannis defoliaria</i> Cl.	21.11-11.12	8	2.12
164	<i>Agriopsis aurantiaria</i> Den. et Schiff.	16.11-14.12	8	27.11
165	<i>Operophtera brumata</i> L.	27.11-13.12	5	27.11
166	<i>Diurnea phryganella</i> Hbn.	20-27.11	2	20.11

3.2. Панцирные клещи (Acariformes, Oribatida)

Приводится предварительный список панцирных клещей Карадагского заповедника. Обработан материал, собранный в 1983 г. Ареалогический анализ фауны приводится в таблице 3.2.

1. Archeonothridae Grandjean, 1932.

1. *Stomacarus tristani* Grandjean, 1952. Тристан да Кунья.

2. Ctenacaridae Grandjean, 1954.

2. *Ctenacarus araneola* Grandjean, 1952. Голарктика.
3. *Gilarovella demetrii* Lange, 1974. Туркмения.

3. Aphelacaridae Grandjean, 1954.

4. *Beklemishevia galeodula* Zachv., 1945. окр. Харькова.

4. Protoplophoridae Ewing, 1917.

5. *Grandjeanoplophora taurica* sp. nov. Карадаг.

5. Mesoplophoridae Ewing, 1917.

6. *Mesoplophora caucasica* D. Kriv., 1975. Кавказ.

6. Phthiracaridae Perty, 1841.

7. *Hoplophthiracarus minus* D. Kriv., 1965. Палеарктика.
8. *Tropacarus carinatus* C.L. Koch, 1841. Палеарктика.
9. *Tropacarus pulcherrimus* Berl., 1887. Ю. Европа, Кавказ.

10. *Steganacarus striculum* C.L. Koch, 1836. Голарктика.
11. *Steganacarus serratus* Feider et Suciu, 1957. Голарктика.
12. *Phthiracarus jacoti* Feider et Suciu, 1957. Румыния.
13. *Phthiracarus dubinini* Feider et Suciu, 1957. Румыния.
14. *Phthiracarus globosus* C.L. Koch, 1841. Европа.
15. *Phthiracarus italicus* Oudemans, 1906. Европа.
7. Euphthiracaridae Jacot, 1930.
 16. *Rhysotritia ardua* C.L. Koch, 1841. Палеарктика.
 17. *Euphthiracarus reticulatus* Berlese, 1913. Д. Европа.
 18. *Euphthiracarus cribrarius* Berlese, 1904. Европа.
8. Oribotritiidae Grandjean, 1954.
 19. *Oribotritia serrata* Feider et Suciu, 1958. Румыния.
9. Eniochthoniidae Grandjean, 1947.
 20. *Hypochthoniella minutissima* Berlese, 1904. Космополит.
10. Cosmochthoniidae Grandjean, 1947.
 21. *Cosmochthonius tenuisetus* Gordeeva, 1980. Крым.
 22. *Cosmochthonius reticulatus* Grandjean, 1947. Средиземноморье.
 23. *Cosmochthonius plumatus* Berlese, 1910. Средиземноморье.
 24. *Cosmochthonius ponticus* Gordeeva, 1980. Крым.
 25. *Cosmochthonius lanatus* Michael, 1887. Средиземноморье.
 26. *Cosmochthonius* sp. nov. Карадаг.
 27. *Phylozeres taurucus* Gordeeva, 1978. Крым.
 28. *Phylozeres latipholius* Gordeeva, 1980. Средиземноморье.
 29. *Phylozeres emmae* (Berlese, 1910). Средиземноморье.
11. Haplochthoniidae van der Hammen, 1959.
 30. *Haplochthonius simplex* Wilmann, 1950. Д. Европа.
12. Sphaerochthoniidae Grandjean, 1947.
 31. *Sphaerochthonius splendidus* Berlese, 1904. Д. Европа.
 32. *Sphaerochthonius nigricans* Gordeeva, sp. nov. Крым.
13. Brachychthoniidae Balogh, 1943.

33. *Brachychthonius bimaculatus* Willmann, 1936. Ю. Европа.
34. *Brachychthonius cricoides* Weis-Fogh, 1948. Палеарктика.
35. *Sellnickochthonius suecicus* Forsslund, 1942. Голарктика.
36. *Sellnickochthonius rostratus* Jacot, 1936. Голарктика.
37. *Poecilochthonius italicus* Berlese, 1910. Голарктика.
38. *Poecilochthonius* sp. Карадаг.
39. *Synchthonius crenulatus* Jacot. Голарктика.
40. *Liochthonius forsslundi* Mahunka, 1969. Палеарктика.
41. *Liochthonius perpussilus* Berlese, 1910. Палеарктика.
42. *Eobrachychthonius latior* Berlese, 1910. Палеарктика.
14. *Lohmaniidae* Berlese, 1916.
 43. *Thamnacarus desertisola* Grandjean, 1934. Средиземно-морье.
 44. *Papilacarus aciculatus* Berlese, 1905. Ю. Европа.
 45. *Cryptacarus promecus* Grandjean, 1950. Средиземноморье.
 46. *Lohmannia paradoxa* Haller, 1884. Космополит.
15. *Epilohmanniidae* Oudemans, 1923.
 47. *Epilohmannia cylindrica* Berlese, 1904. Ю. Европа.
 48. *Epilohmannia inexpectata* Schuster, 1960. Ю. Европа.
 49. *Epilohmannia gigantea* Berlese, 1917. Ю. Европа.
16. *Nothridae* Berlese, 1896.
 50. *Nothrus biciliatus* C.L.Koch, 1841. Палеарктика.
17. *Camisiidae* Oudemans, 1900.
 51. *Camisia biurus* C.L.Koch, 1839. Голарктика.
18. *Trhypochthoniidae* Berlese, 1904.
 52. *Trhypochthonius tectorum* Berlese, 1896. Палеарктика.
 53. *Trhypochthonius nigricans* Willmann, 1928. Средиземно-морье.
 54. *Trhypochthonius cladonicola* Willmann, 1919. Палеарктика.
19. *Nanhermanniidae* Sellnick, 1928.
 55. *Nanhermannia comitalis* Berlese.

56. *Cythermannia tuberculata* Balogh, 1958. Палеарктика.
20. *Hermanniidae* Sellnick, 1928.
57. *Hermannia subglabra* Berlese, 1910. Ю. Европа.
21. *Hermanniellidae* Grandjean, 1934.
58. *Hermanniella punctulata* Berlese, 1908. Ю. Европа.
22. *Liodidae* Grandjean, 1954.
59. *Neoliodes theleproctus* Hermann, 1804. Средиземноморье.
60. *Platyliones dodarlaini* Berlese, 1904. Ю. Европа.
23. *Gymnodamaeidae* Grandjean, 1954.
61. *Aleürodamaeus setosus* Berlese, 1883. Средиземноморье.
62. *Allodamaeus hispanicus* Grandjean, 1928. Средиземноморье.
63. *Plesiodamaeus glaber* Mihelcic, 1957. Ю. Европа.
64. *Licnoliones andrei* Grandjean, 1931. Ю. Европа.
24. *Plateremaeidae* Tragardh, 1931.
65. *Plateremaeus santus* Gordeeva sp. nov. Карадаг.
66. *Pedrocortesia* cf. *inaequalis* Balogh et Mahunka. Ю. Европа.
67. *Licnodamaeus pulcherrimus* Berlese. Ю. Европа.
68. *Licnodamaeus costula* Mihelcic. Ю. Европа.
69. *Licnodamaeus novus* Gordeeva sp. nov. Карадаг.
25. *Licnobelbidae* Grandjean, 1965.
70. *Licnobelba alestensis* Grandjean, 1931. Средиземноморье.
26. *Damaeidae* Berlese, 1896
71. *Spatiodamaeus fagetti* Bul.-Zachv., 1957. Крым.
72. *Hypodamaeus tauricus* Bul.-Zachv., 1957. Крым.
73. *Epidamaeus flexispinosus* Kunst, 1961. Ю. Европа.
27. *Belbidae* Willmann, 1931.
74. *Belba limasetosa* Bul.-Zachv., 1962. Крым.
75. *Metabelba pulverulenta* C.L. Koch, 1836. Европа.
76. *Metabelba flagelliseta* Bul.-Zachv., 1965. Крым, Болга-

рия.

77. *Metabelbella tichonravovi* Bul.-Zachv., 1965. Крым.
28. Cepheidae Berlese, 1896.
78. *Oribatodes crenulatus* Csiszar, 1962. Болгария.
79. *Ommatocephaeus ocelatus* Michael, 1882. Д. Европа.
80. *Sphidrocephus* sp. Карадаг.
29. Microzetidae Grandjean, 1936.
81. *Nellacarus* ? sp. Карадаг.
82. *Microzetes auxiliaris* Grandjean, 1936. Средиземноморье.
83. *Microzetes alcer* Piffel, 1961. Средиземноморье.
84. *Berlesezetes grandjeani* Mahunka, 1977. Средиземноморье.
30. Amerobelbidae Grandjean, 1954.
85. *Amerobelba decedens* Berlese, 1908. Д. Европа.
31. Ctenobelbidae Grandjean, 1965.
86. *Ctenobelba meridionalis* Gord. sp.n. Карадаг.
32. Eremulidae Grandjean, 1965.
87. *Eremulus elegans* Gordeeva, 1985. Карадаг.
33. Damaeolidae Grandjean, 1965.
88. *Damaeolus ornatissimus* Berlese. Д. Европа.
89. *Fosseremus laciniatus* Berlese, 1905. Д. Европа.
34. Eremobelbidae Balogh, 1961.
90. *Eremobelba geographica* Berlese, 1908. Д. Европа.
35. Ameridae Grandjean, 1965.
91. *Amerus troisi* Berlese, 1883. Д. Европа.
36. Eremaeidae Sellnick, 1928.
92. *Eremaeus tuberosus* Gordeeva, 1970. Крым.
37. Zetorchestidae Michael, 1898.
93. *Microzetorchestes emerii* Goggel, 1898. Европа.
94. *Zetorchestes flambrarius* Grandjean, 1951. Европа.
95. *Zetorchestes saltator* Oudemans, 1916. Средиземноморье.

38. Gustaviidae Oudemans, 1900.

96. *Gustavia microcephala* Nicolet, 1855. Палеарктика.

97. *Gustavia longirostris* Mihelcic, 1957. Средиземноморье.

39. Metrioppiidae Balogh, 1943.

98. *Metrioppia* cf. *helvetica* Grandjean, 1931. Палеарктика.

40. Ceratoppiidae Kunst, 1971.

99. *Ceratoppia* sp. Крым.

41. Astegistidae Balogh, 1961.

100. *Cultroribula juncta* Michael, 1885. Европа.

101. *Cultroribula confinis* Berlese, 1908. Европа.

42. Liacaridae Sellnick, 1928.

102. *Adoristes* sp. Карадаг, Новый Свет.

103. *Dorycranosus badhysi* D. Kriv., 1966. Средиземноморье.

104. *Dorycranosus punctulatus* Mihelcic, 1956. Ю. Европа.

105. *Dorycranosus moraviacus* Willmann, 1954. Европа.

106. *Liacarus* cf. *brevilamellatus* Mihelcic. Ю. Европа.

107. *Liacarus lencoranicus* D. Kriv., 1967. Кавказ, Крым.

108. *Liacarus xylariae* Schrank, 1803. Европа.

43. Xenillidae Woolley et Higgins, 1966.

109. *Xenillus tegeocranus* Hermann, 1804. Палеарктика.

110. *Xenillus discrepans* Grandjean, 1936. Палеарктика.

111. *Xenillus penicilliger* Strenzke. Средиземноморье.

44. Carabodidae C. L. Koch, 1837.

112. *Austrocarabodes foliaceisetus* D. Kriv. Средиземноморье.

113. *Carabodes minusculus* Berlese, 1923. Европа.

45. Tectocephidae Grandjean, 1954.

114. *Tectocephus sarekensis* Tragardh. Европа.

115. *Tectocephus alatus* Berlese, 1904. Средиземноморье.

116. *Tectocephus minor* Berlese, 1904. Европа.

46. Suctobelbidae Grandjean, 1954.

117. *Suctobelbella perpendiculata* Forsslund, 1941. Ю. Европа.

118. *Suctobelbella perforata* Strenzke, 1950. Европа.
119. *Suctobelbella alloenasuta* Moritz, 1971. Европа.
120. *Suctobelbella tuberculata* Strenzke, 1950. Европа.
121. *Suctobelba sorrentensis* Hammer, 1961. Европа.
122. *Suctobelba atomaria* Moritz, 1970. Европа.
47. Autognetidae Grandjean, 1960.
123. *Autogneta parva* Forsslund. Голарктика.
48. Oppiidae Grandjean, 1954.
124. *Multioppia laniseta* Moritz, 1966. Европа
125. *Quadroppia media* Gordeeva, 1983. Крым
126. *Oppiella nova* Oudemans, 1902. Космополит.
127. *Lauroppia maritima* (Willmann, 1929). Палеарктика.
128. *Cosmoppia ornata* (Oudemans, 1900). Голарктика.
129. *Microppia minutissima* (Sellnick, 1950). Европа.
130. *Microppia minus* (Paoli, 1908). Голарктика.
131. *Cylindroppia cylindrica* (Perez-Inigo, 1964). Ю. Палеарктика.
132. *Rectoppia fasciata* (Bernini, 1973). Средиземноморье.
133. *Anomaloppia chitinophincta* (Kulijew, 1962). Кавказ, Ю. Украины.
134. *Epimerella puzanovi* Gordeeva, 1987. Карадаг.
135. *Berniniella bicarinata* (Paoli, 1908). Палеарктика.
136. *Berniniella formosa* Gordeeva, 1987. Крым.
137. *Ctenoppiella gomozovae* Gordeeva, 1987. Крым.
138. *Ctenoppiella fallax* (Paoli, 1908). Средиземноморье.
139. *Ctenoppiella obsoleta* (Paoli, 1908). Средиземноморье.
140. *Serratoppia mitrofanovi* (Gordeeva, 1987). Крым.
141. *Oppia nitens* C.L.Koch. Ю. Европа.
142. *Javieroppia cervus* Subias. Испания.
143. *Oppiella falcata* (Paoli, 1908). Европа.
144. *Ramusella insculpta* (Paoli, 1908). Средиземноморье.
145. *Ramusella assimilis* (Mihelcic, 1956). Ю. Европа.
146. *Oppia krivolutskii* Kulijew, 1966. Ю. Европа.
49. Cymbaeremaeidae Sellnick, 1928.
147. *Scapheremaeus patella* Berlese, 1886. Средиземноморье.
50. Micreremidae Grandjean, 1954.
148. *Micreremus brevipes* Michael, 1888. Европа.
149. *Micreremus gracillior* Willmann, 1931. Европа.

51. *Licneremaeidae* Grandjean, 1931.
150. *Licneremaeus licnophorus* Michael, 1888. Палеарктика.
151. *Licneremaeus prodigiosus* Schuster, 1958. Европа.
52. *Passalozetidae* Grandjean, 1954.
152. *Passalozetes africanus* Grandjean, 1932. Средиземно-море.
153. *Passalozetes hispanicus* Mihelcic, 1955. Средиземно-море.
53. *Scutoverticidae* Grandjean, 1954.
154. *Scutovertex rugosus* Mihelcic. Средиземноморье.
54. *Oribatullidae* Thor., 1929.
155. *Simphauloppia interrupta* Jeleva, 1962. Европа.
156. *Phauloppia wineani* Trave, 1961. Средиземноморье.
157. *Oribatula tibialis* Nicolet, 1855. Космополит.
158. *Oribatula pallida* Banks, 1906. Голарктика.
159. *Zygoribatula* cf. *exarata* Mihelcic. D. Европа.
160. *Zygoribatula frisiae* Oudemans, 1900. Палеарктика.
161. *Zygoribatula vulgaris* Bul.-Zachv., 1967. D. Европа.
162. *Zygoribatula vera* Bul.-Zachv., 1967. Европа.
163. *Zygoribatula microporosa* Bul.-Zachv., 1967. Европа.
164. *Zygoribatula exilis* Nicolet, 1855. Европа.
165. *Simkinia tianschanica* D.Kriv., 1966. D. Палеарктика.
166. *Romanobates reticulatus* Felder et Vasiliu, 1970. Румыния.
167. *Eporibatula rauschensis* Sellnick, 1928. Европа.
168. *Pseudoppia mediocris* Perez-Inigo, 1966. Средиземно-море.
55. *Scheloribatidae* Grandjean, 1953.
169. *Liebstadia similis* Michael, 1888. Палеарктика.
170. *Hemileius initialis* Berlese, 1908. D. Палеарктика.
171. *Scheloribates labyrinthicus* Jeleva, 1962. Европа.
172. *Scheloribates* cf. *fimbriatus* Thor, 1930. D. Палеарктика.
173. *Scheloribates laevigatus* C.L.Koch, 1836. Палеарктика.
174. *Scheloribates* sp. Карадаг.
175. *Scheloribates* sp. Карадаг.

56. Haplozetidae Grandjean, 1936.

- 176. *Xylobates* cf. *lagenula* Berlese, 1904. Средиземноморье.
- 177. *Xylobates monodactylus* Haller, 1804. Европа.
- 178. *Xylobates lophotricus* Berlese, 1904. Голарктика.
- 179. *Xylobates divergens* Mihelcic, 1955. Средиземноморье.
- 180. *Xylobates glaber* Mihelcic, 1955. Д. Европа.
- 181. *Haplozetes vindobanensis* Willmann, 1935. Палеарктика.
- 182. *Haplozetes*1. Карадаг.
- 183. *Haplozetes*2. Карадаг.
- 184. *Peloribates longipilosus* Csiszar, 1962. Европа.
- 185. *Peloribates europaeus* Willmann, 1953. Палеарктика.

57. Chamobatidae Grandjean, 1954.

- 186. *Chamobates dentotutori*1 Shaladybina, 1969. Кавказ, Крым.
- 187. *Chamobates dentatus* Mihelcic, 1959. Средиземноморье.
- 188. *Chamobates voigtsi* Oudemans, 1902. Европа.
- 189. *Chamobates subglobulus* Oudemans, 1900. Европа.
- 190. *Chamobates lapidarius* Lucas, 1849. Европа.
- 191. *Chamobates* sp. Карадаг.

58. Euzetidae Grandjean, 1954.

- 192. *Euzetes globulus* Nicolet. Европа.

59. Ceratozetidae Jacot, 1925.

- 193. *Ceratozetes fusiger* Mihelcic. Палеарктика.
- 194. *Ceratozetes contiguus* Jeleva, 1962. Д. Европа.
- 195. *Ceratozetes piritus* Grandjean, 1951. Европа.
- 196. *Ceratozetes simulator* Perez-Inigo, 1969. Средиземно-морье.
- 197. *Ceratozetella bregetovae* Shaladybina, 1970. Крым, Кавказ.
- 198. *Ceratozetoides cisalpinus* Berlese, 1908. Голарктика.
- 199. *Oromursia sudetica* Willmann, 1939. Европа.
- 200. *Trichoribates punctatus* Shaladybina, 1971. Средиземно-морье.
- 201. *Trichoribates oxypterus* Berlese, 1910. Д. Европа.
- 202. *Latilamellobates naltshicki* Shaladybina, 1971. Европа.

60. Mycobatidae Grandjean, 1954.

- 203. *Mycobates bicornis* Strenzke, 1954. Палеарктика.

Таблица 3.2. Ареалогический анализ фауны панцирных клещей Карадага

Распространение	Число видов	%
Южная Европа	49	22.0
Европа	43	19.4
Средиземноморье	39	17.6
Палеарктика	30	13.5
Карадаг	18	8.1
Голарктика	14	6.3
Крым	14	6.3
Кавказ	5	2.2
космополит	4	1.8
Юг Палеарктики	4	1.8
Средняя Азия	2	0.9
всего	222	100

204. *Minunthozetes pseudofusiger* Schweizer, 1922. Палеарктика.

205. *Punctoribates mundus* Shaldybina, 1973. Средиземноморье.

206. *Punctoribates meridionalis* Shaldybina, 1973. Крым, Кавказ.

61. *Pelopidae* Ewing, 1917.

207. *Eupelops nepotulus* Berlese, 1917. Ю. Европа.

208. *Eupelops subuliger* Berlese, 1917. Ю. Европа.

209. *Eupelops caucasicus* Sitnikova, 1975. Ю. Европа.

210. *Peloptulus phaenotus* C.L. Koch, 1844. Палеарктика.

62. *Tegoribatidae* Grandjean, 1954

211. *Lepidozetes* sp. Карадаг.

63. *Achipteridae* Thor, 1929.

212. *Achipteria sellnicki* v.d. Hammen, 1952. Европа.

213. *Achipteria italica* Oudemans, 1913. Европа.

64. Oribatellidae Jacot, 1925.

214. Oribatella phillophora Jeleva, 1962. Болгария.

215. Oribatella sp. Карадаг.

216. Oribatella meridionalis Berlese, 1908. Палеарктика.

65. Galumnidae Jacot, 1925.

217. Galumna flagellata Willmann, 1923. Европа.

218. Galumna lanceata Oudemans, 1900. Палеарктика.

219. Pergalumna myrmophila Berlese, 1915. Ю. Европа.

220. Pergalumna nervosa Berlese, 1915. Голарктика.

221. Pilogalumna tenuiclava Berlese, 1908. Палеарктика.

222. Allogalumna crassiclava Berlese, 1914. Ю. Европа.

3.3. Ихтиофауна

По результатам инвентаризации ихтиофауны в первой половине 80-х годов опубликован список рыб акватории Карадагского заповедника, включающий 81 вид (Салехова и др., 1987; 1989; дополнения - Костенко, 1992). В последующие годы нами обнаружены не вошедшие в список виды (табл. 3.3).

Таблица 3.3. Дополнение к списку рыб акватории Карадагского природного заповедника

Вид	Последние опубликованные сведения о встречаемости в районе Карадага	Наши данные
1	2	3
Сардина-пильчард <i>Sardina pilchardus</i> (Walbaum)	Приведена в полном списке ихтиофауны Карадага (Список..., 1984)	В 1997 г. неоднократно ловилась ставным неводом в п. Коктебель.
Трехиглая колюшка <i>Gasterosteus aculeatus</i> L.	Приведена в списке А. Н. Смирнова (1959). В 80-х годах встречалась за пределами	В 1992 г. в Карадагской бухте поймано 3 экз.

1	2	3
	заповедника в районе пос. Орджоникидзе (Салехова и др., 1989)	
Остронос <i>Liza saliens</i> (Risso)	Приведена в списке А. Н. Смирнова (1959)	В 1989 и 1997 гг. обнаружена икра в планктоне.
Пиленгас <i>Mugil so-luy Basi-</i> <i>lewsky</i>	-	Этот интродуциро- ванный в Черном море вид указыва- ется для района Карадага впервые. С 1990 года лови- тся ежегодно. В 1997 г. впервые найдена икра.
Меч-рыба <i>Xiphias gladius</i> L.	А. Н. Смирнов (1959) приводит вслед за К. А. Виноградовым (1949)	В июне 1991 г. в Лисьей бухте об- наружена икринка (Гордина, Багню- кова, 1992).
Бланкет <i>Aphia minuta medi-</i> <i>terranea</i> (Risso)	Приведен в списке А. Н. Смирнова (1959)	В 1990 г. в план- ктоне поймана ли- чинка.
Бычок-буберь <i>Pomatoschistus</i> sp.	А. Н. Смирнов (1959) указывал вид <i>P. mic-</i> <i>rops</i> (Kr.), К. А. Вино- градов (1949) - на возможное нахождение <i>P. minutus elongatus</i> (Canestrini)	С 1989 г. в план- ктоне ежегодно встречаются личи- нки, не определе- нные до вида.

1	2	3
Присоска <i>Lepadogaster lepadogaster</i> (Bonnaterre)	А. Н. Смирнов (1959) приводит этот вид под названием <i>L. gouani</i> Lacepede	В 1990 и 1996 гг. в планктоне обнаружены личинки. В 1991 и 1997 гг. пойманы взрослые экземпляры.
Полосатый окунь <i>Morone saxatilis</i>		В 1995 г. пойман 1 экземпляр.

В 1997 г. ставник не был установлен, лов рыбы производился только дифномом и крючками. В уловах обнаружено 33 вида рыб, в ихтиопланктонных сборах - 31 вид, всего в карадагской акватории зарегистрировано 44 вида.

В июне 1997 г. в Коктебельской бухте ловилась сардина-пильчард *Sardina pilchardus*, не отмечавшаяся у Карадага несколько десятилетий. Исследованные особи имели длину $L=13,5-16,3$ см, $l=11,5-14,0$ см, массу 15,5-25,4 г.

8 июня 1997 г. впервые у побережья Карадага найдены икринки пиленгаса. Эта дальневосточная кефаль размножается сейчас в разных районах черноморского побережья, что говорит об успешной натурализации пиленгаса в Черном море.

Данные о численности ихтиопланктона акватории Карадага представлены в таблицах 3.4 и 3.5. В 1997 г. по сравнению с предыдущими годами (Летопись природы, 1996) увеличилась интенсивность икрематания массовых видов - хамсы и султанки; многочисленными в планктоне были также икринки гребенчатого губана, ласкиря, морской мыши, арноглоса. В сравнении с первой половиной 90-х годов численность икры увеличилась у ставриды и звездочета и снизилась у скорпены и калкана. Численность личинок осталась на прежнем уровне.

Распределение массовых видов ихтиопланктона по глубинам показано в таблицах 3.6 и 3.7. Пожалуй, только хамса - пелагический вид с обширным ареалом - предпочитает нереститься не у самого берега, а на некотором расстоянии от него. Почти все остальные виды

Таблица 3.4. Средняя численность икринок рыб (экз/100 м³) в поверхностном слое воды в районе Карадага

Вид	1997			
	V ¹	VI	VII	VIII ²
шпрот	0.1	0.2	-	-
хамса	10.0	750.5	228.0	64.0
налим	-	-	-	-
мерланг	-	-	-	0.5
ошибень	-	3.0	8.5	39.5
луфарь	-	-	1.3	1.5
ставрида	-	0.3	2.8	1.3
ласкирь	-	29.2	18.5	9.0
горбыль	-	3.0	0.1	11.8
султанка	6.8	226.4	538.8	249.8
губан	11.3	22.0	-	0.5
дракон	-	-	3.1	2.3
звездочет	-	-	3.3	9.3
морская мышь	3.4	42.8	8.6	4.5
скорпена	-	1.0	2.9	11.8
тригла	-	0.1	-	-
калкан	0.9	3.7	-	-
арноглюс	-	-	12.6	10.8
солея	-	1.7	1.4	1.3
остронос	-	0.1	-	-
пиленгас	-	0.1	-	-
Общая численность икры	32.6	1085.4	833.3	418.0
Кол-во ловов	8	11	8	4

Примечание: ¹ - вторая половина мая, ² - первая половина августа.

Таблица 3.5. Средняя численность личинок рыб (экз/100 м³) в поверхностном слое воды в районе Карадага

Вид	1997			
	V ¹	VI	VII	VIII ²
1	6	7	8	9
шпрот	-	-	-	-
хамса	-	3.7	0.3	0.8
черномор. атерина	-	0.1	-	-
сарган	-	-	-	-
высокорылая игла	-	-	-	-
морской конек	-	-	-	-
луфарь	-	0.1	-	-
ласкирь	-	-	0.3	-
темный горбыль	-	0.1	-	-
султанка	-	1.2	23.4	-
рябчик	0.1	0.4	-	-
перепелка	0.4	0.4	-	0.3
зеленушка	0.6	0.7	0.4	-
Labridae	0.1	0.2	0.3	0.3
Gobiidae	5.3	3.4	4.9	1.5
морская мышь	-	0.1	0.4	-
собачка-сфинкс	-	-	0.1	0.3
хохлатая собачка	-	-	-	-
собачка-павлин	0.9	1.9	14.6	11.8
пятнистая собачка	-	5.3	-	-
длиннопупальцевая собачка	-	5.3	15.1	9.0
бурая собачка	0.1	0.4	1.5	0.3
Blenniidae	0.1	2.2	10.9	2.5
скорпена	-	-	0.1	1.0
тригла	-	-	-	-
арноглот	-	-	-	-
солея	-	-	-	-
присоска	-	-	-	-

Продолжение табл. 3.5

1	6	7	8	9
Общая численность личинок	7.8	25.5	73.0	27.5
К-во ловов	8	11	8	4

Примечание: ¹ - вторая половина мая, ² - первая половина августа.

относятся к узкоприбрежному комплексу и размножаются на небольших глубинах (губан, мышь, султанка, ласкирь, солея, скорпена, горбыль, звездочет, арноглот, дракон). Некоторые флуктуации в распределении объясняются большей частью влиянием течений. Личинки донных видов меньше привязаны к глубинам и осваивают более широкий

Таблица 3.6. Средняя численность (экз/100 м³) икринок рыб над разными глубинами в 1997 г.

Виды	Июнь		Июль		Август*	
	10 м	30 м	10 м	30 м	10 м	30 м
СOLEЯ	2.3	1.0	2.8	-	2.0	0.5
Скорпена	1.8	-	5.5	0.3	21.0	2.5
Ошибень	5.5	-	16.3	0.8	-	79.0
Ставрида	0.5	-	5.3	0.3	0.5	2.0
Темный горбыль	5.5	-	0.3	-	23.5	-
Звездочет	-	-	6.5	-	18.5	-
Арноглот	-	-	25.3	-	20.5	1.0
Луфарь	-	-	2.5	-	-	3.0
Дракон	-	-	6.3	-	4.5	-
Общая численность	1260.0	875.8	1336.3	330.3	378.0	458.0
Количество ловов	6	5	4	4	2	2

Примечание: * - первая половина августа.

Таблица 3.7. Средняя численность (экз/100 м³) личинок рыб над разными глубинами в 1997 г.

Виды	Июнь		Июль		Август*	
	10 м	30 м	10 м	30 м	10 м	30 м
Собачки Blenniidae	7.2	24.4	83.3	1.3	36.5	5.5
Бычки Gobiidae	3.2	3.8	8.5	1.3	1.5	1.5
Зеленушки Labridae	2.3	0.8	1.0	0.3	0.5	0.5
Хамса	1.8	6.0	0.5	-	1.0	0.5
Султанка	1.0	1.4	46.8	-	-	-
Общая численность	16.0	37.0	143.3	2.8	42.5	7.5
Количество ловов	6	5	4	4	2	2

Примечание: * - первая половина августа.

ареал, чем занимают нерестилища этих видов.

Несмотря на сравнительно небольшую акваторию, численность ихтиопланктона в разных районах отличается. Как показывают таблицы 3.8 и 3.9, количество как икры, так и личинок в заповедной акватории (Золотые Ворота и мыс Мальчин) в 1997 г. было значительно ниже, чем в прилегающих Лисьей бухте и зоне поселка Курортное. Последние два района, особенно Лисья бухта, характеризуются обширной

Таблица 3.8. Средняя численность (экз/100 м³) икринок рыб в период массового нереста (июнь-июль) в 1997 г.

Массовые виды	Лисья бухта	пос. Ку- ортное	Золотые Ворота	Мыс Мальчин
1	2	3	4	5
Хамса	698.0	470.8	591.2	408.0
Калкан	-	-	0.6	6.3
Гребенчатый губан	27.8	2.3	1.8	18.8
Морская мышь	62.0	47.5	1.2	16.0
Султанка	662.3	755.5	11.2	78.8

1	2	3	4	5
Ласкирь	65.3	39.3	0.4	8.2
Солея	3.8	2.0	-	1.2
Скорпена	1.8	6.5	-	0.2
Ошибень	7.8	17.0	-	0.3
Ставрида	1.3	5.0	-	-
Темный горбыль	7.0	1.5	-	-
Арноглос	5.5	19.8	-	-
Общая численность	1700.8	1383.0	606.6	539.5
Общее число видов	14	15	7	12
Количество ловов	4	4	5	6

Таблица 3.9. Средняя численность (экз/100 м³) личинок рыб в период массового нереста (июнь-июль) в 1997 г.

Массовые виды	Лисья бухта	пос. Ку-портное	Золотые Ворота	Мыс Мальчин
Собачки <i>Blenniidae</i>	83.5	5.8	5.8	19.5
в т.ч.:				
Bl. pavo	28.8	1.3	0.4	2.7
Bl. tentacularis	29.3	3.0	2.2	6.5
Бычки <i>Gobiidae</i>	7.8	2.5	2.6	3.8
Зеленушки <i>Labridae</i>	2.8	1.0	1.2	0.3
Хамса	3.5	2.5	0.6	2.7
Султанка	1.5	47.0	0.6	0.5
Общая численность	100.8	61.0	11.0	27.2
Общее число видов	12	14	8	10
Количество ловов	4	4	5	6

мелководной зоной, а хорошая прогреваемость воды и заросли фитобентоса благоприятствуют нересту многих прибрежных видов и откорму молоди. Крутой уклон берега у Золотых Ворот не способствует концентрации нерестовых стад и созданию "детской площадки", поэтому численность икры и личинок здесь низкая.

Литература

1. Виноградов К.А. Список рыб Черного моря, встречающихся в районе Карадагской биологической станции, с замечаниями об их биологии и экологии //Тр. Карадаг. биол. станции, 1949. - Вып. 7. - С.76-106.
2. Гордина А.Д., Багнюкова Т.В. О нересте меч-рыбы *Xiphias gladius* L. в Черном море //Вопр. ихтиол., 1992. - Т.32, вып. 4. - С. 166.
3. Костенко Н.С. Рыбы //Карадагский государственный заповедник. Летопись природы, 1988. Т. V. - Симферополь: Редотдел Крымского комитета по печати, 1992. - С. 70-74.
4. Салехова Л.П., Костенко Н.С., Богачик Т.А., Минибаева О.Н. Состав ихтиофауны в районе Карадагского государственного заповедника (Черное море) //Вопр. ихтиол., 1987. - Т. 27, вып. 6. - С. 898-905.
5. Салехова Л.П., Костенко Н.С., Вронский А.А. Ихтиофауна //Природа Карадага. - Киев: Наук. думка, 1989. - С. 242-252.
6. Смирнов А.Н. Материалы по биологии рыб Черного моря в районе Карадага //Тр. Карадаг. биол. станции, 1959. - Вып. 15. - С. 31-110.
7. Список видов флоры и фауны акватории Карадагского госзаповедника. Рыбы - Pisces // Карадагский государственный заповедник АН УССР. Летопись природы, 1984. - Карадаг, 1984. - Т.1, кн.2. - С. 159-162.

3.4. Птицы

3.4.1. Новые виды

В 1997 г. было отмечено 4 вида, новых для заповедника. Впервые зарегистрировано гнездование 2 видов.

Скопа - *Pandion haliaetus*. Отмечена 22.04 на береговой линии у ск. Иван-Разбойник.

Серая куропатка - *Perdix perdix*. Гнездовая пара наблюдалась 8.05 у восточной границы заповедника, на прибрежном участке кустарниковой растительности.

Турухтан - *Phylomachus pugnax*. Стайка из 13 птиц, пролетающая вдоль береговой линии заповедника в северо-восточном направлении, зарегистрирована 22.03.

Большой веретенник - *Limosa limosa*. В тот же день была отмечена пролетающая вдоль берега на северо-восток стайка из 9 особей.

Московка - *Parus ater*. Ранее в заповеднике была известна только как зимующая птица. Поющий у дупла самец наблюдался 3.05 в лесу на г. Сюрю-Кая Е.С. Преображенской.

Чечевица - *Carpodacus erythrinus*. Наблюдалась 30.04 и 4.05 в кустарниковой растительности Кокташской балки А.С.Савиным.

3.4.2. Данные учетов и фенонаблюдений

В 1997 г. для учетов гнездящихся птиц использовалось 5 учетных маршрутов: по Карадагской долине вдоль Тумановой балки (1,7 км); по северному склону г.Святой (1,3 км); по южному склону хр.Карагач (0,7 км); по берегу от Коктебеля до м.Тупой (2,8 км); вдоль побережья на катере (6 км). Методика проведения учетов по сравнению с прошлыми годами не менялась. Результаты приводятся в таблицах 3.10 и 3.11.

Отмечено также гнездование следующих видов, не зарегистрированных во время маршрутных учетов.

Ястребиная славка - *Sylvia nisoria*. Кустарниковая растительность в поселке заповедника: 1 пара.

Полевой воробей - *Passer montanus*. Парк заповедника: 9.06 наблюдалась птица, строящая гнездо в здании.

Таблица 3.10. Гнездящиеся птицы древесно-кустарниковых биотопов

Вид	О б и л и е ¹			Даты феноявлений
	Л	ДФР	МР	
1	2			3
Accipiter gen-tilis	1*	-	-	5.05 насиживание

1	2	3
Buteo buteo	1*	-
Alectoris ka- kelik	1.4	-
Phasianus col- chicus	-	0.2
Columba palum- bus	0.3	0.2
Streptopelia turtur	0.4	0.2
Otus scops	1*	-
Caprimulgus europaeus	-	+
Cuculus cano- rus	1*	-
Dendrocopos maior	2*	-
Anthus trivia- lis	0.5	0.2
Lanius collu- rio	-	+
Garrulus glan- darius	0.8	-
Pica pica	-	0.4
Corvus cornix	-	0.2
Sylvia atrica- pilla	1.0	-
S. communis	1.5	4.1
Phylloscopus sibilatrix	0.5	-
Phoenicurus phoenicurus	1.2	0.3
Erithacus ru- becula	0.4	-

14.08 летные птенцы

16.05 воркование

17.09 последняя
встреча

13.06 токование

31.05 птенцы

23.04 прилет (1 са-
мец)

30.03 строит гнездо

2.05 пары в гнез-
довом биотопе, пение

21.06 вылупление

1	2			3
Luscinia megarhynchos	0,2	0,3	-	13.04 пение
Turdus merula	1,0	0,1	-	11.02 пение 3.05 кладка 1 яйцо
Turdus philomelos	0,2	-	-	-
Turdus viscivorus	0,2	-	-	27.05 слетки
Parus ater	1*	-	-	3.05 пение
P. caeruleus	0,4	0,3	-	-
P. major	2,6	2,0	1,4	11.02 пение
Fringilla coelebs	4,2	2,2	1,9	11.02 попытка пения 5.03 пение 31.05 слетки
Acanthis cannabina	0,5	-	-	-
Emberiza citrinella	-	-	3,6	-
E. hortulana	-	0,4	-	-

¹ Условные обозначения типов насаждений: Л - леса; ДФР - дубовые и фисташковые редколесья; МР - редколесья можжевельника высокого. Приводится количество пар на 10 га. * - общее количество пар, отмеченных в заповеднике; + - вид отмечен, но численность неизвестна.

Таблица 3.11. Гнездящиеся птицы скальных биотопов и морского берега

Вид	Обилие	Биотоп	Даты феноявлений
1	2	3	4
Phalacrocorax aristotelis	47	Береговые скалы	1.04 насиживание в большинстве гнезд
Anas platyrhynchos	2	Береговые склоны	-

1	2	3	4
<i>F. cherrug</i>	1	Скалы (хр. Сюрю-Кая)	12.03 пара в гнез- довом биотопе
<i>Falco peregrinus</i>	1	Скалы (хр. Карагач)	14.06 летные птенцы
<i>F. tinnunculus</i>	>=3	Скалы (хр. Сюрю-Кая, Икылмак)	-
<i>Larus argentatus</i>	65	Береговые скалы и островки	20.01 пары на гнез- довых участках 22.04 кладка 1 яйцо 29.04 копуляция 8.05 насиживание 6.07 птенцы слетели
<i>Oenanthe pleschanka</i>	3 пар/км	Морской берег, пляж (Коктебель-м. Тупой)	14.06 слетки
<i>Apus melba</i>	+	скалы	23.04 брачные игры
<i>Corvus corax</i>	>=4	скалы	с 8.05 выводки

Еще 4 вида отмечены на гнездовании на территории поселка Карадагского заповедника.

Белая трясогузка - *Motacilla alba*. 2 пары, гнездятся в постройках: 14.06 наблюдались летающие птенцы.

Обыкновенный скворец - *Sturnus vulgaris*. Обычен. Птицы, строящие гнезда, регистрировались 26.04 и 12.06.

Ястребиная славка - *Sylvia nisoria*. 1 пара: кустарниковая растительность.

Полевой воробей - *Passer montanus*. Отмечена 1 пара: 9.06 наблюдалась копуляция и постройка гнезда.

Учеты зимующих птиц морской акватории и берега проводились с конца ноября 1996 года до конца февраля 1997 года (ск. Левинсона-Лессинга - Лисья бухта: маршрут 5 км). Обработаны данные 4 учетных экскурсий (таблица 3.12).

Таблица 3.12. Зимующие птицы береговой полосы и прибрежной морской акватории (5-километровый маршрут)

Вид	Обилие ¹	Даты
<i>Gavia arctica</i>	2,0 (3,2) экз./км	с 11.10.96
<i>Podiceps ruficollis</i>	1	2.01.97
<i>P. auritus</i>	1	3.02.97
<i>P. nigricollis</i>	3,7 (5,2) экз./км	с 6.10.96
<i>P. grisegena</i>	1,4 (4,0) экз./км	с 6.10.96
<i>P. cristatus</i>	4,1 (14,8) экз./км	с 9.10.96
<i>Phalacrocorax carbo</i>	1,1 (2,0) экз./км	6.10.96-11.03.97
<i>Ph. aristotelis</i>	6,3 (11,8) экз./км	оседлый
<i>Egretta alba</i>	5	2.01.97
<i>Anser albifrons</i>	до 67	27.12.01-23.01.97
<i>Cygnus olor</i>	31	3.01.97
	до 6	14.01-20.01.97
<i>Tadorna tadorna</i>	4	2.01.97
<i>Anas platyrhynchos</i>	71,8 (128)	9.12.96-31.01.97
		max 28.12-8.01
<i>A. crecca</i>	40	24.12.96
<i>A. penelope</i>	1	3-31.01.97
<i>Netta rufina</i>	до 6	29.12.96-3.01.97
<i>Aythya ferina</i>	1	30.12.96
<i>A. fuligula</i>	3	4.02.97
<i>Mergus albellus</i>	1	3.01 и 12.01.97
<i>M. serrator</i>	0,5 экз./км	с 23.12.96
<i>Egretta alba</i>	5	2.01.97
<i>Fulica atra</i>	38,9 (77,0) экз./км	с 25.12.96
<i>Tringa ochropus</i>	1	3.01.97-март
<i>Larus ichthyaetus</i>	1	2.01-7.01.97
<i>L. melanocephalus</i>	1	2.01.97
<i>L. ridibundus</i>	до 4	с 16.12.96
<i>L. argentatus</i>	3,2 экз./км	круглогодично
<i>L. canus</i>	до 200	27.12.96-4.02.97
<i>Sterna sandvicensis</i>	1	3.02.97
<i>Motacilla cinerea</i>	1	2.01.97

¹Приводится средняя (в скобках максимальная) плотность или абсолютная численность.

Приводим также данные о видах птиц, отмеченных вне маршрута, по которым получен конкретный материал.

Черный гриф - *Aegypius monachus*. 1.02.97 - 5 птиц над территорией заповедника.

Полевой лунь - *Circus aeruginosus*. 30.12.96 и 1.01.97 - на степных участках и в редколесьях, одиночные птицы.

Орлан-белохвост - *Haliaeetus albicilla*. 6.01.97 - молодая птица наблюдалась над северным склоном хр. Карагач.

Сапсан - *Falco peregrinus*. 1.12.96 - над поселком Карадагского заповедника.

Вальдшнеп - *Scolopax rusticola*. В редколесьях и у ручьев: 30.12.96, 1.02 и 7.02.97.

Луговой конек - *Anthus pratensis*. 9.12.96 и 2.01.97: морской берег и прибрежные участки, единично.

Серый сорокопут - *Lanius excubitor*. В редколесье Карадагской дол., 21.12.

Обыкновенный скворец - *Sturnus vulgaris*. В указанный зимний сезон на Южном берегу Крыма численность была необычно высокой. В парке Карадагского заповедника одиночки появились 25.12.96; 7-9.01.1997 здесь держалось 300-500 особей. Птицы в массе поедали плоды софоры.

Зарянка - *Erithacus rubecula*. Наблюдалась 28.12.1996 на берегу Карадагской бухты, где кормилась в полосе прибоя на выбросах водоросли *Cystoseira* sp.

Горихвостка-чернушка - *Phoenicurus ochruros*. 7-11.01.97, на морском берегу и в редколесьях: одиночки.

Певчий дрозд - *Turdus philomelos*. 30.12.96 и 24.01.97: в парке заповедника и в сосновых посадках Тумановой балки: одиночные птицы.

Деряба - *Turdus viscivorus*. Наблюдался 23.01.97 в парке заповедника.

Крапивник - *Troglodytes troglodytes*. Морской берег у западной границы заповедника, 1 птица.

Обыкновенный дубонос - *Coccothraustes coccothraustes*. С 15.10.96 по 28.04.97. Стайки до 30 птиц: древесная растительность.

Московка - *Parus ater*. 30.12.96, Южный перевал, посадки туи: 2 птицы.

Большая синица - *Parus major*. 28.12.96 кормилась на выбросах водоросли *Cystoseira* sp. в зоне прибоя Карадагской бухты.

Просянка - *Emberiza calandra*. 6.01.1997, северный склон хр.

Карагач: 15 особей.

Горная овсянка - *Emberiza cia*. 17.12.1996: сад в поселке Карадагского заповедника: 5 птиц.

Полевой воробей - *Passer montanus*. 1.01.97 стайка из 15 птиц кормилась плодами фисташки туполистной в окрестностях поселка заповедника.

Чиж - *Spinus spinus*. С 6.10.96 в открытых биотопах и парке заповедника: стайки до 18.

Получены данные по следующим видам пролетных и летнекочующих птиц.

Чернозобая гагара - *Gavia arctica*. На акватории Карадагской б., 14.11 (5).

Серощекая поганка - *Podiceps grisegena*. На морской акватории в районе Лягушачьей б., 29.04 (3).

Малый буревестник - *Puffinus puffinus*. На летних кочевках у берегов заповедника: 6.08 (6) и 10.08 (стая, наблюдение М.О. Мищенко).

Большой баклан - *Phalacrocorax carbo*. Стая (21), летящая над сушей в северном направлении, наблюдалась 11.03; на летних кочевках - 5.08.

Кваква - *Nycticorax nycticorax*. Наблюдалась на кипарисе в парке заповедника 19.04.

Желтая цапля - *Ardeola ralloides*. На морском берегу в районе Лягушачьей б., 8.05 (2).

Малая белая цапля - *Egretta garzetta*. 8.05, пролетела над морским берегом в северо-восточном направлении.

Серая цапля - *Ardea cinerea*. Над акваторией и территорией заповедника, с 14.04 по 8.05 (12).

Рыжая цапля - *Ardea purpurea*. Наблюдалась с 14.04 по 11.05 над Карадагом и на морском берегу, а также на деревьях в парке заповедника (7).

Перепелятник - *Accipiter nisus*. Регулярные встречи в негнездовых биотопах (редколесья, населенные пункты) - с 30.08, 16.09 отмечены 3 птицы.

Скопа - *Pandion haliaetus*. Данные приводятся в разделе "Новые виды".

Осоед - *Pernis apivorus*. Гнездование этого вида в заповеднике не установлено, отмечались поздневесенние и летние встречи в Карадагской дол. и в районе г. Святой: 31.05, 3.06 и 14.08.

Черный коршун - *Milvus migrans*. Над поселком заповедника и Карадагской дол.: 29.04.

Змееяд - *Circaetus gallicus*. Залеты в заповедник отмечены 10 и 16.08.

Кобчик - *Falco vespertinus*. Встречен на Северном перевале у границы леса и степного участка 3.05.

Перепел - *Coturnix coturnix*. Весной наблюдался 2 и 16.05 (2), на осеннем пролете - 15.08-17.09 (22, в т.ч. 17.09 - 20 птиц); встреча 29.11 относится, возможно, к зимующей птице. Биотопы - редколесья, степи, пустыри на бывших пастбищах.

Серый журавль - *Grus grus*. Пролетали 1.04 (2) в северном и 4.04 (12) в северо-западном направлениях.

Коростель - *Sorexorex*. Редколесье Карадагской дол., участок сорной растительности: 12.09.

Вальдшнеп - *Scolopax rusticola*. В редколесье на юго-восточном склоне хр. Беш-Таш, 24.03 (3).

Черноголовая чайка - *Larus melanosephalus*. Карадагская б., 21.03 (4); над хр. Лобовым и поселком заповедника, 31.03 (около 70). Осенью наблюдалась в Карадагской б. 7-8.10 (до 2).

Озерная чайка - *Larus ridibundus*. 31.01, несколько птиц в стае с черноголовыми чайками.

Клуша - *Larus fuscus*. Карадагская б., 18.04 (3), пролетели в западном направлении; 6.05 - 1 в районе Лягушачьей б.

Пестроносая крачка - *Sterna sandvicensis*. На весеннем пролете - 8.05 в районе Лягушачьей б.; на осеннем - 7.08 единично в Карадагской б. и 18-24.09 (до 5) там же.

Сизый голубь - *Columba livia*. Летом и в послегнездовой период совершают кормовые кочевки в редколесьях Карадагской дол.: отмечены 11.06 (5) и 12.09 (45).

Обыкновенная горлица - *Streptopelia turtur*. Сад в поселке заповедника, 17.09.

Обыкновенная кукушка - *Cuculus canorus*. Наблюдалась на открытом скалистом участке южного склона хр. Карагач 8.05.

Черный стриж - *Apus apus*. Начало весеннего пролета - 14.04 (стайки до 12).

Сизоворонка - *Coracias garrulus*. В редколесьях дол. Беш-Таш, 8.05.

Зимородок - *Alcedo atthis*. Держался на пресном водоеме в поселке заповедника: 7.05, а также 5-15.08 (до 2).

Золотистая щурка - *Merops apiaster*. На весеннем пролете -

29.04-22.05 (стайки до 10). Осенью - 31.08-16.09, максимальная численность зарегистрирована 15.09 (птицы летели весь день, пролетело не менее тысячи особей). Отдельные стайки охотятся над участками редколесий и степных биотопов.

Удод - *Upupa epops*. В редколесьях и населенных пунктах: весной 2-21.04, на осеннем пролете - 3-4.08.

Вертишейка - *Luph torquilla*. Редколесье Тумановой бал., 16.04: отмечен кричащий самец.

Городская ласточка - *Delichon urbica*. Пролетные стайки наблюдались 6.04 (несколько птиц) и 25.04 над морским берегом и акваторией (около 10).

Деревенская ласточка - *Hirundo rustica*. Отмечены 6.04 над морским берегом (6) и 1.05 (около 20, летели в северном направлении).

Полевой жаворонок - *Alauda arvensis*. В окрестностях поселка заповедника на степном участке, 21.03 (около 10).

Чернолобый сорокопут - *Lanius minor*. Был обычным (группы до 5) 6-8.05, в открытых и кустарниковых биотопах.

Иволга - *Oriolus oriolus*. Регулярно в редколесьях и парке заповедника (группы до 3), с 20.04 по 6.06.

Розовый скворец - *Sturnus roseus*. На степном участке у поселка заповедника, 16.05 (15), в стае с обыкновенными скворцами.

Ворон - *Corvus corax*. Стая из 20 птиц зарегистрирована 10.08 над заповедником.

Крапивник - *Troglodytes troglodytes*. Первая встреча на зимовке - 6.10.

Лесная завирушка - *Prunella modularis*. Кустарниковая растительность в окрестностях поселка заповедника: 24.03.

Дроздовидная камышовка - *Acrocerphalus arundinaceus*. Поселок заповедника, древесно-кустарниковая растительность в балке: 6 и 7.05 регистрировался поющий самец.

Черноголовая славка - *Sylvia atricapilla*. Там же в саду: 3.09.

Славка-завирушка - *Sylvia curruca*. Редколесье Карадагской дол., 7.09.

Пеночка-весничка - *Phylloscopus trochilus*. Древесно-кустарниковая растительность всех типов, 20.04 - 6.06: многочисленна.

Пеночка-теньковка - *Phylloscopus collybita*. В тех-же биотопах, с 6.04: обычна.

Пеночка-трещетка - *Phylloscopus sibilatrix*. Редколесья и степные участки Карадагской дол., парк заповедника: 24-25.04 (7).

Желтоголовый королек - *Regulus regulus*. Поздневесенние встречи возможно пролетных птиц зарегистрированы 30.04 и 4.05 на лесных участках.

Малая мухоловка - *Ficedula parva*. Древесно-кустарниковая растительность, с 7.09 по 5.10; наиболее обычной была с середины сентября.

Серая мухоловка - *Muscicapa striata*. Разреженная древесная растительность, парк, 25.04-8.05, обычной была 29.04. Осенью встречена 7.09 (2).

Луговой чекан - *Saxicola rubetra*. Поляна в лесу на северном склоне г. Святой, 8.05 (2).

Обыкновенная каменка - *Oenanthe oenanthe*. Открытые (в основном степные), скалистые биотопы, редколесья: весной с 18 до 23.04 (7); на осеннем пролете - с 3 по 27.08 (13).

Плешанка - *Oenanthe pleschanka*. В негнездовом биотопе отмечена 8.08.

Обыкновенная горихвостка - *Phoenicurus phoenicurus*. Древесно-кустарниковая растительность, парк: с 3 по 22.04 (обычной была 10.04) и с 18.09 по 5.10 (обычна).

Горихвостка-чернушка - *Phoenicurus ochruros*. В парке заповедника, 20 и 30.03.

Рябинник - *Turdus pilaris*. Первое появление пролетных птиц - 15.03 в редколесьях Карадагской дол. (не менее 2).

Певчий дрозд - *Turdus philomelos*. Зарегистрированы в редколесьях Карадагской дол. и парке 23.03 и 21.04.

Деряба - *Turdus viscivorus*. Редколесья Карадагской дол., с 7.09 (3).

Московка - *Parus ater*. Встречены в стайке больших синиц в лесу на склоне г. Сюрю-Кая 3.05 (2).

Вьюрок - *Fringilla montifringilla*. Лес на склоне г. Святая: 30.04.1997 Е.С.Преображенская наблюдала поющего самца.

Обыкновенная чечевица - *Carduelis erythrinus*. Данные приводятся в главе "Новые виды".

¹ В скобках приводится общее количество птиц, зарегистрированных в пределах указанных сроков.

4. Календарь природы на 1997 г.

В 1997 г. проводились наблюдения за некоторыми климатическими параметрами (температура воздуха, снеговой покров) а также фиксировались сроки лета наиболее обычных видов чешуекрылых и феноявления в жизни птиц.

Таблица 4.1. Даты основных фенологических явлений

Наблюдаемое явление	Самая ранняя дата	Самая поздняя дата
1	2	3
Переход максимальных t ниже 0	3.02	
Переход максимальных t выше 0	5.02	
Пение большой синицы	11.02	
Начало лета на свет пяденицы хиспидарии	21.02	
Массовое цветение крокуса	3.03	
Появление белой трясогузки	10.03	
Переход минимальных t выше 5	30.03	27.04
Пролет серого журавля	30.03	25.04
Появление бабочки каллимахуса	31.03	
Прилет вжного соловья	13.04	
Пролет пеночки-веснички	20.04	6.06
Прилет сорокопута-жулана	23.04	
Появление бабочки зорьки		
Появление бабочки чернушки	2.05	
Фегей		
Первый крик сплюшки	5.05	
Переход минимальных t выше 10	7.05	5.06

Продолжение табл. 4.1

1	2	3
Появление бабочки деревенской медведицы	14.05	
Появление "красных" пестрянок	24.05	
Появление бабочки цирцеи	12.06	
Переход минимальных t ниже 10	5.09	
Первый заморозок на почве	27.10	
Первый снегопад	16.12	
Первый снеговой покров	16.12	

5. Состояние заповедного режима

5.1. Сведения о землепользовании в Карадагском заповеднике и его охранной зоне

Виды землепользования и площади фактически использованных земель приводятся в табл. 5.1. Охранная зона 21 га используется как пастбища и сенокосы.

Таблица 5.1. Землепользование в Карадагском заповеднике в 1997 г.¹

Вид землепользования	Фактически использовано (га)	Примечание
Усадьба КФ	11,3	
Кордоны	0,82	
Сенокосы	12,8	для лесной охраны
Дорога автомобильная	2,45	дорога к посту ВЧ
	4,65	практически не
	0,4	эксплуатируется
Дороги		
Экологическая тропа	0,15	
Искусственные водоемы	0,6	
Пашни	2,3	последние 11 лет
		не эксплуатируются
Лесные культуры	228,74	
Итого	264,21, или	
	12,8 % от общей пло-	
	щади земельного фонда	
	заповедника	

- ¹Примечание. 1) 0 площади, занимаемой постом ВЧ нет данных.
2) Определенные лесоустройством 115,5 га как прочие земли в таблице не использованы, т.к. под ними имелись ввиду выходы скальных пород, заброшенные карьеры и т.п.

5.2. Частичное пользование природными ресурсами

В 1997 г. проводилось сенокошение на площади 12,8 га. в основном на нужды лесной охраны и сотрудников заповедника, а также как противопожарные мероприятия вдоль основной проезжей дороги к посту ВЧ. Подробные сведения приведены в табл. 5.2.

Таблица 5.2. Данные о сенокошении на территории заповедника в 1997 г

Обход N	N квар- тала	N вы- дела	Пло- щадь, га	Вид по- коса	пользо- ватель	Число заго- товок
1	2	1, 1а, 5	0,5	постоян.	лесная охрана	1
1	5	18, 22	0,3	"-	"-	1
2	6	7, 10	1,1	"-	"-	1
2	7	1	1,0	"-	"-	1
3	8	2	0,5	"-	"-	1
3	10	3	0,5	"-	"-	1
4	11	1	1,0	"-	"-	1
2	14	4	0,3	"-	"-	1
3	15	6, 19	1,3	"-	"-	1
4	16	15	0,4	"-	"-	1
6	21	18	1,4	"-	"-	1
4	26	17	1,0	"-	"-	1
6	31	1	1,0	"-	"-	1
7	35	15	0,3	"-	"-	1
7	36	17, 24	1,0	"-	"-	1
7	37	13	1,0	времен.	сотр.	1
8	40	5	0,2	постоян.	л/о	1
3, 4 ¹			0,5	противо- пожарн.	л/о	2
Всего:			12,8			

¹ Дорога к посту ВЧ.

5.3. Прямые и косвенные внешние воздействия, нарушения заповедного режима

В 1997 году отмечен беспрецедентный рост численности дикого кабана, а также косули и фазана. Согласно учета охотничьей фауны, который был проведен 18 ноября, было зарегистрировано не менее 35-37 голов кабана, что в 5-6 раз превышает установленные лесоустройством нормы для территории Карадагского заповедника. До учета сотрудниками лесной охраны наблюдался выход из заповедника не менее двух стад дикого кабана, так что общее количество этого животного на Карадаге явно превышало (и периодически превышает) отмеченное в процессе учета. В результате высокой численности дикий кабан в 1997 году нанес заметный вред растительному покрову заповедника: уничтожил значительную часть урожая желудей дуба пушистого и дуба скального, а также путем многочисленных пороев в различных участках нарушил целостность почвы и травянистой растительности.

Работа по определению точных количественных размеров этого ущерба в настоящее время проводится, для изучения дикого кабана в условиях Карадагского заповедника привлечены соответствующие специалисты.

Нарушения заповедного режима отражены в таблице 7.3.

Таблица 7.3. Нарушения заповедного режима

Вид нарушения	Место	Последствия
Заход плавсредства в акваторию заповедника (СЧС - 647)	акватория заповедника	Акт направлен в рыбинспекцию

Дополнение

Обработаны дополнительные материалы наблюдений за некоторыми параметрами окружающей среды, полученные на фоновой станции экологического мониторинга. Среднемесячные значения этих параметров приводятся в таблице 1.

Таблица 1. Некоторые параметры окружающей среды

Параметр	Среднемесячное значение											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
гамма-фон, мкР/час	7,3	8	7	9	11	12	10	15	12	13	10	12
температура почвы, град.	2,1	1,8	2,8	9,2	15	22	25	24	17	11	6	3
температура воздуха, град.	-1,8	-1,5	3,2	9,5	16	21	23	20	19	13	8	4
относительная влажность												
воздуха, %	79	76	79	77	67	58	56	72	70	73	-	75

СОДЕРЖАНИЕ

1. Наблюдения на Карадагском ландшафтно-экологическом стационаре (А. В. Зуев).....	3
1.1. Полевая влажность почв.....	3
1.2. Метеорология.....	4
1.3. Грунтовые воды.....	6
1.4. Поверхностный сток.....	6
2. Флора и растительность.....	9
2.1. Макрофитобентос (Н. С. Костенко).....	9
2.2. Фитопланктон (Н. Г. Кустенко).....	12
2.3. Современное состояние представителей флоры высших сосудистых растений (Л. П. Миронова).....	20
2.4. Плодоношение основных лесообразующих пород (М. Е. Кузнецов).....	33
2.4.1. Плодоношение <i>Pinus pithyusa</i>	35
2.4.2. Плодоношение <i>Juniperus excelsa</i>	35
2.4.3. Плодоношение <i>Pistacia mutica</i>	35
2.4.4. Плодоношение <i>Quercus pubescens</i> и <i>Quercus petraea</i>	35
3. Фауна и животное население.....	40
3.1. Насекомые: Чешуекрылые (Будашкин Ю. И.).....	40
3.1.1. Новые виды.....	40
3.1.2. Состояние видов.....	40
3.2. Панцирные клещи (Acariformes, Oribatida) (Гордеева Е. В.).....	48
3.3. Ихтиофауна (Багнюкова Т. В.).....	58
3.4. Птицы (Бескаравайный М. М.).....	66
3.4.1. Новые виды.....	66
3.4.2. Данные учетов и фенонаблюдений.....	67
4. Календарь природы (Зуев А. В., Будашкин Ю. И., Бескаравайный М. М.).....	77
5. Состояние заповедного режима (Ярыш В. Л.).....	79
5.1. Сведения о землепользовании в Карадагском заповеднике и его охранной зоне.....	79
5.2. Частичное пользование природными ресурсами.....	80
5.3. Прямые и косвенные внешние воздействия, нарушения заповедного режима.....	81
6. Дополнение.....	82

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК УКРАИНЫ

КАРАДАГСКИЙ ПРИРОДНЫЙ ЗАПОВЕДНИК

Летопись природы, 1997

Подписано к печати 14.09.98
Заказ 132. Тираж 150. Цена договорная

Отпечатано НПЦ "ЭКОСИ-Гидрофизика"
Севастополь, ул. Ленина, 28.