



ЗАМЕТКА

Первая находка землероя атлантического *Lithognathus mormyrus* (L., 1758) (Osteichthyes, Sparidae) в черноморской прибрежной зоне Крыма. [Перша знахідка атлантичного землерою *Lithognathus mormyrus* (L., 1758) (Osteichthyes, Sparidae) у чорноморській прибережній зоні Криму; The first find of the sand steenbras *Lithognathus mormyrus* (L., 1758) (Osteichthyes, Sparidae) in the Black Sea coastal zone of the Crimea]. Экземпляр землероя атлантического *Lithognathus mormyrus* (L., 1758) был обнаружен 23 июня 2013 г. в улове промысловой донной ловушки, стационарно установленной в прибрежной зоне Юго-Западного Крыма в районе м. Айя в координатах 44°28,8'с.ш., 33°37,4'в.д. на глубине 40 м. Вскоре после поимки он погиб и был передан в ИнБЮМ для достоверного установления видовой принадлежности и проведения морфометрического анализа. В настоящее время хранится в Коллекции гидробионтов Мирового океана ИнБЮМ в ихтиологической секции под № АВ-0759. Общая длина исследованного экземпляра составила 219,8 мм; стандартная – 185 мм (до конца чешуйного покрова); масса тела – 138,3 г, возраст, определённый по чешуе, – 3 года. Меристические признаки: *D* XI 12; *A* III 10; *P* 15; *l.l.* 62. Описание: Профиль головы крутой, задняя ноздря имеет форму щели. В передней части верхней челюсти 10 конических зубов, боковые зубы жевательные, крупные. Спина и бока серебристо-серые, брюшная часть тела светлая, голова наиболее тёмная, коричневатая. На боках вертикальные тёмные полосы, 13 ярко выраженных, на хвостовом стебле ещё две коротких и малозаметных, более тёмные и длинные полосы чередуются с более светлыми и короткими. Брюшные и анальный плавники желтоватые, остальные серые, спинной и хвостовой заметно темнее. Землерой атлантический достигает стандартной длины 55 см, обычно – до 25 см (Васильева, 2007). Основу питания составляют ракообразные, моллюски, морские черви и другие ракообразные. Протандрический гермафродит, половое созревание наступает в возрасте двух лет при длине около 14 см, среди мелких особей преобладают самцы, продолжительность жизни до 12 лет (Васильева, 2007; www.species-identification.org). Придонный вид, обитает на шельфе до глубины 80 – 150 м, а также в эстуариях, преимущественно над песчаным, илисто-песчаным дном и среди водорослей. Распространён в морях Средиземноморского бассейна, в Восточной Атлантике от Бискайского залива до м. Доброй Надежды, в Красном море и южнее Мозамбика (www.species-identification.org). В Чёрном море до недавнего времени был известен по единичным находкам у берегов Болгарии в Варненском заливе (Васильева, 2007) и Румынии (Stanciu, Ilie, 1980). Возле побережья Крыма обнаружен впервые. По сведениям А. Артамонова, опубликованным в журнале «Рыбачьте с нами» (№9, 2007), землерой атлантический облавливался рыбаками любителями возле побережья Кавказа в эстуарных зонах рек Хоста, Мацеста, Кудепста, Мзымта, но эта информация требует подтверждения. Данные в FishBase (<http://www.fishbase.org>, 2012) об обитании этого вида в Чёрном и Азовском морях не соответствует действительности. Как типично демерсальный вид, не совершает длительных миграций, но к юго-западному побережью Крыма, очевидно, проник самостоятельно из Мраморного моря. Примечательно, что двумя месяцами ранее 26 апреля 2013 г. в этом же самом месте и так же донной ловушкой впервые в Чёрном море был выловлен зубатый групер *Epinephelus caninus* Valenciennes, 1834 (Болтачев и др., 2013). И, наконец, малёк средиземноморского долгопёра *Dactylopterus volitans* (L., 1758) общей длиной около 40 мм был пойман отдыхающими руками на поверхности воды 30 июня 2013 г. в районе севастопольского пляжа п.г.т. Любимовка, сфотографирован и выпущен в живом виде. Фотографии малька сотрудница Восточно-Черноморской рыбоохраны Е. Даньшина передала в ИнБЮМ для идентификации, что было выполнено первыми двумя авторами этой заметки. Малёк имел очень характерные для *D. volitans* видовые признаки: тупая скошенная вниз голова; нижний рот; большие глаза; грудные плавники очень длинные, простираются почти до окончания хвостового стебля и имеют свободные нижние лучи; верхняя часть тела красновато-коричневая с шестью поперечными более тёмными широкими полосами. До настоящего времени в Чёрном море известен лишь один случай находки этого вида в Одесском заливе в сентябре 1997 г. (Мовчан, 2000). **А. Р. Болтачев**, канд. биол. наук, зам. дир., **Е. П. Карпова**, м.н.с. (Институт биологии южных морей НАН Украины, Севастополь, Украина), **М. П. Кирин**, вет. врач (Севастопольский аквариум)