

ВОПРОСЫ МОРСКОЙ ПАРАЗИТОЛОГИИ



КНГВ — 1976

использованы в пищу без предварительной обработки.

Личинки рода *Parasacculum* нами были отмечены у 320 рыб /14%/, относящихся к 53 видам. Личинки рода *Paraparasacculum* обнаружены у 23 рыб /1%/, одиннадцати видов с интенсивностью инвазии 1-4 нематоды в одной рыбе.

Из личиночных стадий скребней, обнаруженных в полости тела рыб, следует отметить *Metasentis socialis*, встреченных у 150 рыб /6,5%/, относящихся к 32 видам, при интенсивности заражения от единичных экземпляров до нескольких десятков в одной рыбе; *Gorgorhynchus gibberum*, найденных у 57 рыб /2,3%/, относящихся к 26 видам, и *Polbosoma vasculosum*, найденных у 40 рыб /1,7%/, относящихся к 19 видам. Личинки скребней мелкие и, поселяясь на внутренних органах рыбы, не являются препятствием для ее использования в пищевых целях.

А.М. ПАНУХИН, В.М. ЭПШТЕЙН

НОВЫЕ ДАННЫЕ О ГЕОГРАФИЧЕСКОМ РАСПРОСТРАНЕНИИ
И ХОЗЯЙСТВАХ ПИЛВКИ *Trachelobdella lubrica*

ИНБЮМ АН УССР, Харьковский зооветинститут

Trachelobdella lubrica Grube, 1840/ — один из немногих хорошо изученных видов морских пилвок. Обстоятельное внешнеморфологическое описание этого вида имеется в работах Апати /1888/, Бланшара /1894/, Мейера /1935/. Строение полового аппарата этой пилвки изучали Брумид /1900/ и Мейер /1935/. В последней работе имеется также описание морфологии кишечника.

По данным авторов, изучавших *T. lubrica*, этот вид обитает в Адриатическом и Средиземном морях /Палермо, Неаполь, Марсель, у побережья Алжира/, в Атлантическом океане у берегов Сенегала /Дakar/ и в местах, обозначенных следующими координатами: $40^{\circ}30'N$, $20^{\circ}49'W$; $40^{\circ}01'N$, $7^{\circ}06'W$. Кроме того, имеются сведения о нахождении этого вида у атлантического

побережья Европы и в Северном море. По литературным данным, *T. lubrica* паразитирует на разных видах рыб из различных семейств: сем. Serranidae сем. Carangidae - *Trachurus trachurus trachurus* [= *Caranx trachurus*], сем. Labridae - *Coris julis* [= *Coris giofredi*], *Labrus* sp., сем. Uranoscopidae - *Uranoscopus scaber*, сем. Blenniidae - *Blennius sanguinolentus* [= *Blennius pholis*], сем. Sparidae - *Diplodus annularis* [= *Sargus annularis*], сем. Gobiidae - *Gobius niger*, сем. Scorpaenidae - *Scorpaena scrofa*, *Scorpaena porcus*, сем. Cottidae - *Taurulus bubalis* [= *Cottus bubalis*], сем. Lophiidae - *Lophius piscatorius*, сем. Soleidae - *Solea solea*. В ряде случаев пиявок *T. lubrica* находили на камнях и на раковинах моллюсков.

Настоящее сообщение основано на изучении коллекции пиявок, собранной А.М. Парухиным, Т.Н. Мордвиновой и В.Н. Лядовым во время экспедиции на НПС "Скиф" в Индийском океане, проходившей с апреля по октябрь 1969 г. В коллекции 17 сборов, включающих 47 экземпляров пиявок. Пиявки собраны в заливе Саукара /Аравийское море/ - 16 сборов, и одна пиявка отмечена у восточного побережья Африки /шельф Лурбана/. В районе залива Саукара материал получен с рыб, выловленных на глубинах 50-60 м, а на траверзе Лурбана пиявка была снята с карангиды, выловленной на глубине 400 м. Нахождение *T. lubrica* в разных районах Индийского океана значительно расширяет наши представления об ареале данного вида. Следует отметить, что пока *T. lubrica* является единственным видом пиявок с ареалом от Северного моря до берегов Южной Америки. В наших сборах пиявки были найдены у 8 видов рыб, ранее не отмеченных в качестве хозяев данного вида, что значительно расширяет сведения о хозяевах этого паразита: сем. Mullidae - *Upeneus sulphureus*, сем. Carangidae - *Caranx adsonionis*, *Trachurus trachurus capensis*, сем. Ietridae - *Ietrinus nebulosus*, сем. Priacanthidae - *Priacanthus boops*, сем. Fistulariidae - *Fistularia petimba*, сем. Siganidae - *Siganus oramin*, сем. Sparidae - *Acanthopagrus bifasciatus*. Очевидно, этот вид пиявок приурочен главным образом к рыбам отряда окунеобразных - Perciformes. Обращает на себя внимание, что особенно много пиявок было найдено на *Ietrinus nebulosus*.